切り口↑

1回分

Kowa

キャベ2コーワソフト

胃の不快感

二日酔のムカムカ



胃の調子がよくなって

食事の前にのむ

胃がスッとします

効能・効果／食べ過ぎ(過食)又は飲み過ぎ(過飲)による胃部不快感及びはきけ(むかつき胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)

用法・用量／成人(15歳以上)1回1包、1日3回食前に服用する。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部
お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL03-3279-7755 FAX03-3279-7566
電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00

4 987067 225002

R3901 A8K

プラ PP,PET

製造販売元 興和株式會社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

医薬部外品

キャベ2コーワソフト 1.3g×1包〈5.4kcal〉

服用に際しては、説明文書をよく読むこと。 使用上の注意 相談すること 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること 医師の治療を受けている人。2.次の場合は、服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること しばらく服用しても症状がよくならない場合

成分・分量(3包中)／塩化カルニチン120.0mg ウコン末 100.0mg サンショウ軟エキス 25.0mg(サンショウとして82.5mg) ニンジン乾燥エキス-E10.0mg(ニンジンとして145.0mg) ショウキョウ末180.0mg チンピエキス 40.0mg(チンピとして320.0mg) ウイキョウ末100.0mg チョウジ末50.0mg カンゾウエキス末70.0mg(カンゾウとして490.0mg)〔添加物〕カルメロースCa、硬化油、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、二酸化ケイ素、l-メントール、キシリトール、エタノール

保管及び取扱い上の注意／(1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

製造番号

使用期限