

鎮咳去痰薬 **新コルゲン^{コーワ}咳止め透明カプセル**

せきは苦しいばかりではなく、長引くとノドや気管支をいためたり、体力を消耗させてしまいます。それに、会議中、乗り物の中など、人がいる所でのせきは、周りの人にまで迷惑をかけてしまう点も困りものです。また、たんはノドにからんで不快だけでなく、せきを引き起こす一因にもなってしまいます。

新コルゲン^{コーワ}咳止め透明カプセルは、ジヒドロコデインリン酸塩やグアイフェネシンなど、効きめのすぐれた成分を液状にして、小さなカプセルに閉じ込めたお薬です。おのみになりますと、液状成分がいち早く溶け出し、せきやたんの症状がおさまってまいります。

⚠ 使用上の注意**⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気があらわれることがある。)

🔥 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
便秘、口のかわき

効能・効果

せき、たん

用法・用量

下記の量を服用する。

ただし、服用間隔は4時間以上おくこと。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3カプセル	3回
15歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守すること。

(2)カプセルの取り出し方：右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



成分・分量(9カプセル中)

成分・分量	働き
ジヒドロコデインリン酸塩 30.0mg	せきの中枢に直接作用して、せきの発生を抑えます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75.0mg	気管支を拡張して、せきをしずめます。
グアイフェネシン 300.0mg	気道粘液の分泌を促して、たんを出しやすくします。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6.0mg	アレルギーが原因となって起こるせきをしずめます。
安息香酸ナトリウムカフェイン 75.0mg	中枢神経系に作用して、眠気を抑えます。

[添加物] ポビドン、マクロゴール、ゼラチン、グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、カラメル

保管及び取扱い上の注意

(1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2)小児の手の届かない所に保管すること。

(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4)PTPのアルミ箔が破れたり、中身のカプセルが変形しないように、保管及び携帯に注意すること。

(5)使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00



Y1371R
09K

 製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

9370D