

胃腸薬

液キヤベ^{コーワ}U

飲みすぎ

ムカムカ

胸やけ

ウコン、オキソアミチン、ニンジン同時配合

● 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 次の診断を受けた人。
腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
2週間位服用しても症状がよくなる場合

● 効能・効果

飲み過ぎ、胃重、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、もたれ、嘔吐、胃酸過多、げっぷ、胃部不快感、食べ過ぎ、胃部・腹部膨満感、消化不良、胸やけ、胸つかえ、食欲不振、胃弱、胃痛

●用法・用量

成人（15歳以上）1日1回、1本を服用する。

- 用法・用量を厳守すること。

●成分・分量（50mL中）

合成ヒドロタルサイト700mg メタケイ酸アルミン酸マグネシウム150mg ウコン流エキス0.33mL（原生薬換算量330mg） オキソアミジン末45mg 人参乾燥エキス135mg（原生薬換算量905mg） 生姜流エキス0.3mL（原生薬換算量300mg） オウレン流エキス-B 0.3mL（原生薬換算量300mg） チンピエキス100mg（原生薬換算量500mg） ハッカ油10mg カンゾウエキス末86mg（原生薬換算量602mg）

〔添加物〕セルロース、カルメロースNa、ポビドン、パラベン、安息香酸Na、白糖、エタノール

- 懸濁内服液ですので服用の際、瓶をよく振ること。

●保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
製 造 中 外 医 薬 生 産 株 式 有 限 公 司 三重県伊賀市ゆめが丘七丁目5-5

- 本製品には添付文書はついておりません。
直接の容器（ビン）の記載事項と同一のものです。