

## ビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤 **キューピーコーワ*i***

現代の疲れは、単純な肉体疲労だけでなく、眼の使い過ぎによる眼精疲労や、首筋から肩にかけての神経や筋肉の疲れからくる肩こりが多く見られ、そのままにしておくと、なかなか疲れがとれないようになってしまいます。眼や肩に疲れを感じたら早めに適切な手当てをすることが重要です。

キューピーコーワ*i* は——— 疲れた神経や筋肉などに不可欠なビタミンB<sub>1</sub>を体にとりこまれやすくした「**活性ビタミンB<sub>1</sub>**」を主薬に、ビタミンB<sub>1</sub>の吸収促進や、血流をよくする働きがある「**オキソアミヂン末**（ニンニクの抽出成分）」を同時処方したお薬です。

本剤をおのみになりますと、神経や筋肉に必要なビタミン等が補給されて、眼精疲労で眼の奥が疲れている人や疲れが肩まで来ている人にすぐれた効きめをあらわします。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること  
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、胃部不快感

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 生理が予定より早きたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談すること
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること  
軟便、下痢、便秘

### 効能・効果

1. 次の諸症状の緩和：  
眼精疲労、筋肉痛・関節痛（肩こり、腰痛、五十肩など）、神経痛、手足のしびれ、便秘
2. 脚気  
「ただし、これら1・2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
3. 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：  
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

### 用法・用量

下記の量を服用すること。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2～3錠	1回
15歳未満の小児	服用しないこと	

#### <用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守すること。

## 成分・分量(3錠中)

成分	分量	働き
ベンフォチアミン(V.B <sub>1</sub> ) (塩酸チアミンとして)	138.3mg (100.0mg)	活性ビタミンB <sub>1</sub> と呼ばれ、神経と筋肉の働きを円滑にし、眼精疲労をはじめ、身体の疲れ等に効果を発揮します。
オキソアミチン末	50.0mg	ニンニクの特有のニオイをおさえた成分で、ビタミンB <sub>1</sub> ・B <sub>6</sub> ・Eの吸収促進や、血流をよくすることで、眼精疲労等に効果を発揮するとともに身体の疲れを改善します。
ガンマ-オリザノール	10.0mg	有効成分が協力しあって働くことで、神経・筋肉の働きを円滑にし、肩こり、腰痛などを改善します。
リボフラビン(V.B <sub>2</sub> )	12.0mg	
塩酸ピリドキシン(V.B <sub>6</sub> )	50.0mg	
シアノコバラミン(V.B <sub>12</sub> )	60.0μg	
コハク酸トコフェロールカルシウム(V.E) (コハク酸dl-α-トコフェロールとして)	103.58mg (100.0mg)	

〔添加物〕クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、タルク、白糖、ゼラチン、アラビアゴム、炭酸Ca、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、酸化チタン、カルナウバロウ、ソルビタン脂肪酸エステル、二酸化ケイ素

### <成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、ビタミンB<sub>2</sub>(リボフラビン)によるものですから心配ありません。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがあるので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないこと。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるもので、キャップをあけた後は必ず捨てること。
- (6) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないこと。
- (7) 容器の落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがあるので、外箱に入れて保管するなど、取扱いに注意すること。



本製品に関するお問い合わせは  
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。  
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
電話受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00

Y12570  
M7X  
78900M