

## 鼻炎用内服薬 **コルゲン<sup>®</sup> 鼻炎ジェルカプセル**

花粉やハウスダストなどによって引き起こされる、鼻づまり、鼻みず、くしゃみなどの鼻炎症状は、単につらく不快なだけでなく、仕事に集中できなくなったり、睡眠をさまたげたりして、日常生活に影響を及ぼしてしまいます。ですから、「効きめのすぐれた」、「服用しやすい」お薬で対処することが大切です。

コルゲン<sup>®</sup>鼻炎ジェルカプセルは、つらい鼻炎の症状にすぐれた効きめをあらわす5種類の有効成分を小さな一粒に閉じ込め、服用しやすくしました。しかも、中味の有効成分が溶け出しやすいように液状にしていますから、おのみになりますと体の中でいち早く溶け出し、すぐれた効きめがあらわれます。また、本剤は食後でなくても、症状がある時にいつでも服用できる便利なお薬です。

用法・用量を守って正しく服用してください。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)
3. 長期連用しないこと



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (7) 次の診断を受けた人。  
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること  
口のかわき、便秘

## 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

## 用法・用量

下記の量を服用する。

ただし、服用間隔は4時間以上おくこと。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1カプセル	3回
15歳未満の小児	服用しないこと	

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)カプセルの取り出し方：右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。）



### 成分・分量（1カプセル中）

成分・分量	働き
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.0mg	アレルギーなどによる、くしゃみ、鼻みずといった症状を改善します。
ベラドンナ総アルカロイド 0.2mg	鼻汁と涙液の分泌を抑制し、鼻みず、なみだ目を抑えます。
フェニレフリン塩酸塩 6.0mg	鼻の粘膜の充血やハレを抑え、鼻づまりをしずめます。
グリチルリチン酸二カリウム 10.0mg	鼻の粘膜の炎症を抑制し、鼻づまりをしずめます。
無水カフェイン 40.0mg	鼻炎に伴う頭重をやわらげます。

〔添加物〕グリセリン脂肪酸エステル、ポリソルベート60、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ゼラチン、グリセリン、酸化チタン、パラベン、ポリソルベート80

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)PTPのアルミ箔が破れたり、中身のカプセルが変形しないように、保管及び携帯に注意すること。
- (5)使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は服用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは  
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。  
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



Y1378R  
09K

 製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

974500