

ビタミン含有保健薬

三才D_{コ-7}/100α

●使用上の注意

相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹等

(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合

●効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

●用法・用量

成人（15歳以上）1回1本、1日1回服用する。

•用法・用量を厳守すること。



●成分・分量(50mL中)

ロクジョウチンキ 0.1mL (ロクジョウとして28.6mg)

塩化カルニチン50.0mg

オキソアミジン100.0mg

ニンジン乾燥エキス45.0mg (ニンジンとして671.6mg)

硝酸チアミン10.0mg

リン酸リボフラビンナトリウム5.0mg

塩酸ピリドキシン10.0mg

ニコチン酸アミド25.0mg

無水カフェイン50.0mg

[添加物]白糖、D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、香料、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン

- リン酸リボフラビンナトリウムにより、尿が黄色になることがある。
- 生薬成分配合のため、まれに混濁を生じることもある。

●保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00



製造販売元 **興和株式会社** 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
製 造 滋 賀 県 製 薬 株 式 会 社 滋 賀 県 甲 賀 市 甲 賀 町 滝 8 7 9

- 本製品には添付文書はついておりません。
直接の容器(ビン)の記載事項と同一のものです。