

胃腸薬

# 液キヤベ<sup>ユーワ</sup>S

胃痛

ムカムカ

もたれ

「胃がスキッとする」

● 使用上の注意

**してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと  
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 次の診断を受けた人。  
腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること  
2週間位服用しても症状がよくならない場合

● 効能・効果

飲み過ぎ、胃重、はきけ（二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心）、もたれ、嘔吐、胃酸過多、げっぷ、胃部不快感、食べ過ぎ、胃部・腹部膨満感、消化不良、胸やけ、胸つかえ、食欲不振、胃弱、胃痛

●用法・用量

成人(15歳以上)1日1回、1本を服用する。

- 用法・用量を厳守すること。

●成分・分量(50mL中)

合成ヒドロタルサイト 600mg オキソアミジン末 30mg 人参乾燥エキス 90mg  
(原生薬換算量 603mg) 生姜流エキス 0.3mL ゴシユ流エキス 0.3mL 蒼朮  
流エキス 0.4mL ウルソデオキシコール酸 15mg カンゾウエキス末 86mg (原生  
薬換算量 602mg) ハッカ油 10mg チンピエキス 100mg (原生薬換算量 500mg)  
〔添加物〕白糖、セルロース、カルメロースNa、ポビドン、安息香酸Na、パラベン、香料、  
エタノール


- 懸濁内服液ですので服用の際、瓶をよく振ること。

●保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは  
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。  
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00



 製造販売元 **興和株式会社** 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
製 造 中外医薬生産株式会社 三重県伊賀市ゆめが丘七丁目5-5

- 本製品には添付文書はついておりません。  
直接の容器(ビン)の記載事項と同一のものです。