

かゆみ・
虫さされ用薬

新ウナークール

●つめたいかゆみ止め！ ●かゆみをダブル作用で止める！

新ウナークールは、かゆみが気持ち良くひいていく、つめたいかゆみ止めです。本剤を塗りますと、かゆくてほてっている患部がまずつめた〜くなります。

このクールな冷却感に続いて、有効成分のリドカインとジフェンヒドラミン塩酸塩のダブル作用により、かゆみを早く止めます。

しかも、患部にムラなく塗布できるように改良した使用感の良いスポンジを採用しています。

蚊やダニなどの虫にさされた時は、まずこの新ウナークールをお使いください。

リドカインが、かゆみの伝わりを止め、かゆみを感じなくします。



ジフェンヒドラミン塩酸塩がかゆみのもとになるヒスタミンの働きをおさえ、かゆみをしずめます。

<模式図>

⚠ 使用上の注意**❌ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 創傷面。
- (2) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

成分・分量(1mL中)

成分・分量	働 き
ジフェンヒドラミン塩酸塩 20.0mg	かゆみのもとになるヒスタミンの働きをおさえ、かゆみをしずめます。
リドカイン 5.0mg	かゆみの伝わりを止め、かゆみを感じなくします。
l-メントール 30.0mg	患部に清涼感を与え、かゆみをやわらげます。
dl-カンフル 20.0mg	

(添加物) エデト酸Na、クエン酸、ゲラニオール、エタノール

効能・効果

かゆみ、虫さされ




用法・用量

1日数回適量を患部に塗布する。

<用法・用量に関連する注意>


- (1)用法・用量を守ること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4)外用にのみ使用すること。
- (5)薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと。また、ひざの裏やひじの内側等に使用する場合は、皮ふを密着（正座等）させないこと。

●容器の正しい使い方

		
1.まずキャップをはずして、図のように容器を逆さに持ってください。	2.ムラなく塗れるようスポンジ面を軽く患部に押しつけ、液を十分に浸透させて塗布してください。	3.使用後は必ずキャップをしっかりとめてください。

※使用感がよく、破れにくいスポンジ素材を使用していますが、液がスポンジ面に充分浸透していないと、スポンジ面が破れるおそれがありますので、注意してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)容器が変形するおそれがあるので、車の中など、高温になる場所に長時間放置しないこと。容器の変形により、スポンジ部分の脱落や、液もれがおこるおそれがあるので注意すること。
- (5)プラスチック類、塗装面等に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意すること。
- (6)火気に近づけないこと。
- (7)使用期限（外箱及び容器に記載）をすぎた製品は使用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00

