

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

**のんで効く 皮膚炎、皮膚のかゆみ、鼻炎のくすり**

アレルギー用薬

## 小粒タウロミン

皮膚疾患の1/3は湿疹・皮膚炎といわれ、近年鼻炎とともにこれらアレルギー症状をあらわす人が増加する傾向にあります。これには、最近の衣・食・住等生活環境の変化に加え、季節・気候等外的因子、体内の変調、栄養状態、ホルモン分泌等内的因子などが深く関係しているといわれます。

小粒タウロミンは、これらの原因による皮膚の炎症や鼻炎（鼻の皮膚粘膜の炎症）に有効な生薬に、カルシウム、ビタミン、アミノ酸などの栄養成分を配合した、皮膚疾患・鼻炎のための内服治療剤です。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと**  
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬）
2. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと**  
（眠気があらわれることがある。）
3. **長期連用しないこと**



#### 相談すること

1. **次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること**
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の症状のある人。 排尿困難
  - (5) 次の診断を受けた人。 緑内障
2. **次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
その他	排尿困難

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合
3. **次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること**  
口のかつき

**効能・効果**

湿疹、皮膚炎、じんま疹、皮膚のかゆみ、鼻炎

## 用法・用量

次の1回量を1日3回服用する。  
症状により通常量の2～3倍服用することもできる。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。
- (4) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

年齢	1回量	1日服用回数
大人	12錠	3回
8～15歳	6錠	
5～7歳	4錠	
3～4歳	2錠	
2歳以下	1錠	

## 成分・分量 (36錠中)

●サイコ末 90mg ●ハマボウフウ末 90mg ●センキュウ末 90mg ●ブクリョウ末 90mg ●オウヒ末 90mg ●キキョウ末 90mg ●シヨウキョウ末 90mg ●ドクカツ末 54mg ●ケイガイ末 54mg ●カンゾウ末 54mg ●リン酸水素カルシウム 1080mg ●乳酸カルシウム 360mg ●ヨクイニン末 360mg ●アミノエチルスルホン酸(タウリン) 36mg ●グルクロノラク トン 36mg ●チアミン硝化物(ビタミンB<sub>1</sub>) 7.2mg ●リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>) 7.2mg ●ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>) 3.6mg ●ニコチン酸アミド 14.4mg ●パントテン酸カルシウム 14.4mg ●イノシトール 18mg ●エルゴカルシフェロール(ビタミンD<sub>2</sub>) 9μg (360国際単位) ●クロルフェニランマレイン酸塩 3.6mg  
〔添加物〕デキストリン、パレイシヨデンパン、カルメロースCa、乳糖、ステアリン酸Mg、タルク

### 〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 本剤は、生薬を配合していますので、ときに錠剤表面に茶褐色の斑点を生じることがありますが、効果には変わりありません。
- (2) 本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)によるものだから、心配ありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 水分が錠剤につくと内容成分の変化のもととなるので、誤って水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないこと。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるもので、キャップをあけた後は、必ず捨てること。また、乾燥剤も必ず捨てること。
- (6) ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合があるので、服用のつどキャップをよくしめること。
- (7) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは  
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。  
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00



発売元

興和株式会社  
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製造販売元

福井製薬株式会社  
大阪市城東区今福東3丁目1番26号