

医薬部外品

Knowa

フィニッシュ **ソフト**

のどの荒れと痛みに

●荒れて痛むのどがスキッとします。

●のどに炎症をおこす菌を直接退治して
のどの不快感をおさえます。



スッキリ感 ユーカリフレーバー

爽やか感 ミントフレーバー

殺菌成分CPC
(塩化セチルピリジニウム)配合

15mL





口腔咽喉薬 **フィニッシュ・ソフト**

▲開け口

■使用上の注意 / **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
長期連用しないこと

使用に際しては、
説明書をよく読むこと。

■相応すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。口内のひどいただれ
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)使用後、
次の症状が
あらわれた場合
(2)5～6日間

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、はきけ

使用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、
使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること 口の刺激感

■効能・効果 / のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ
■用法・用量 / 1日数回、適量をのどの粘膜面に噴射塗布する。

(用法・用量に関連する注意)

(1)口を開けてできるだけ口元に容器を近づけ、のどの患部にノズルを向けて、軽く息をはきながら、1回3～4噴射・1日3～6回を目安として使用すること。(2)噴射の際には、薬液が目に入るのを防ぐために、目を軽く閉じること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(小児(15歳未満)の臨床試験は行われていない)。(4)のどの患部への噴射塗布にのみ使用し、内服用としては使用しないこと。(5)用法・用量を厳守すること。
■成分・分量(1mL中) / 塩化セチルピリジニウム3mg(添加物)グリセリン、エタノール、トメントール、ハッカ油、香料

■保管及び取扱い上の注意 / (1)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)プラスチック類、塗漆面等に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意すること。(5)火気近づけないこと。(6)液が出なくなったり、不衛生になるので、キャップをしっかりと締め、ゴミが付着しないようにすること。(7)キャップをしたまま噴射すると、キャップを飲みこむおそれがあるので、必ずキャップをとってから噴射すること。(8)使用期限(箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

容器の正しい使い方




① キャップをはずした後、
ノズルを反対方向にまわすと、
ポンプが作動状態になります。



■この容器はポンプストッパーがついており、
ノズルを反対方向にまわさないと、液が出ない
ようになっています。

② 頰部を押して、
患部に3～4
噴射すること。
使用後は、ノズルを
もとの位置にもどし、
必ずキャップをはめること。



ノズルの先端を
針等で突つくと折れた
時大変危険なので、
絶対に
やめること。

※最初に使用する時は、液が出るまで4～5回押しこと。

※ノズルがもとの位置にもどっていないか、キャップがしっかりとまわっていないと、キャップがはずれたり、液もれするおそれがあるので注意すること。



ボトル:PP
ポンプ:PP, PE
キャップ:PP
ラベル:PET
袋:PP

●お問い合わせ先
興和(株)くすり相談室
TEL 03-3279-7755
電話受付時間:月～金
(祝日を除く)9:00～17:00

製造販売元 **興和株式会社**

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14



目に入らないように
注意してください。