

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

本薬劑係依據日本國內法令製造販賣。此說明書為依據日本國內法令規定之附件文書之日翻中譯本，僅作為參考依據，並不必然代表遵照日本國外之法令。

第2類醫藥品

服用前請詳閱此說明書，並與本藥劑一起妥善保管。

胃腸藥 **キャベジンコーワα**
Cabagin Kowa α

使用上の注意事項

禁忌

(不遵守注意事項時有可能導致目前症狀惡化，或者容易引發副作用)

1. 在服用本藥劑期間內，請勿服用以下藥物
胃腸鎮痛解痙藥
2. 授乳期婦女請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑時請避免授乳
(服用後會分泌於乳汁中，造成嬰兒脈搏變快。)

諮詢

1. 以下人士請於服用前諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」
 - (1) 正在接受醫師治療者。
 - (2) 孕婦或者是有可能懷孕之婦女。
 - (3) 高齡者。
 - (4) 對藥物等曾發生過敏反應者。
 - (5) 具有以下症狀者。
排尿困難
 - (6) 曾被診斷出以下病症者。
腎臟病、心臟病、青光眼、甲狀腺機能障礙
2. 服用後如出現下列症狀時，有可能是副作用所導致，請立即停止服用並持本說明書諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、搔癢

3. 服用後可能出現下列症狀，當此症狀持續或者惡化時請停止服用，並持本說明書諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」
口乾
4. 若連續服用兩個星期後症狀仍未見改善時，請停止服用，並持本說明書諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」

其他注意事項

可能會影響母乳分泌

效能、效果

胃部不舒服、胃機能低落、胃脹、胃痛、暴食、飲酒過量、胃食道逆流、想吐(反胃、宿醉或者酒醉引起的反胃、想吐、噁心)、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、打嗝、胸悶、促進消化、胃部/腹部膨滿感、胃重壓感

用法、用量

請依以下指示，每飯後以開水或者溫開水服用。

年齡	一次量	一天服用次數
成人(15歲以上)	2錠 ○○	3次
8歲以上15歲未滿	1錠 ○	
未滿8歲孩童	請勿服用	

< 關於用法、用量的注意事項 >

- (1) 請嚴守用法、用量。
- (2) 孩童應在監護人之指導下服用。

成分、含量(6錠中)

●維他命 U 150.0mg ●碳酸氫鈉 700.0mg ●碳酸鎂 250.0mg ●沉降碳酸鈣 1200.0mg ●莨菪根部萃取物 3 倍散 90.0mg (相當於莨菪根部萃取成分 30.0mg) ●乾燥紫蘇葉萃取物 30.0mg (相當於乾燥紫蘇葉成分 270.0mg) ●當藥粉末 30.0mg ●Biodiastase 2000 24.0mg ●脂肪酶 AP12 15.0mg

[賦形劑] 羧丙基纖維素(HPC)、氫化脂肪、羧甲基纖維素鈣、玉蜀黍澱粉、硬脂酸鎂、硬脂酸甘油酯、聚氧乙烯硬脂酸酯、蟲膠、滑石、桂皮、聚乙烯醇(PVA)(部份皂化物)、纖維素、二氧化矽、l-薄荷醇、糊精

< 關於成分、含量的注意事項 >

含有維他命 U 等成分，具有特殊氣味。

保存上之注意事項

- (1) 請拴緊瓶蓋並避免高溫、陽光直射，宜保存於乾燥陰涼處。
- (2) 請保存於兒童不易拿取之處。
- (3) 請勿將本藥劑移放到其他容器。(以避免誤用或者引起品質變化。)
- (4) 當藥劑受潮時，會使得特殊氣味變濃而導致成分變化，故請勿讓水滴入容器內或者使用潮濕的手接觸藥劑。
若不慎弄濕藥劑，請將沾有水分的藥劑丟棄。
- (5) 瓶內的填充物是為了防止錠劑在搬運過程中發生破損，開瓶後請務必取出丟棄。
- (6) 請務必於每次服用後拴緊瓶蓋以避免藥劑因受潮等引起變質。
- (7) 請於外包裝盒及藥瓶的「開瓶日期」記載欄填上開瓶日期。
- (8) 藥劑超過有效期限(記載於外包裝盒及藥瓶的記載欄)時，請勿服用。此外，為確保品質，請於開瓶後 6 個月內服用完畢。



製造販賣商 興和株式會社 東京都中央區日本橋本町三丁目 4-14

Y1200 R3K 43110A