

2錠入り

上下の袋に1錠ずつ
包装されています



この分包は、服用の際にはよく
読み、大切に保管してください。

キュービーコーワゴールドα錠 (ビタミン含有保健剤 指定医薬部外品)

使用上の注意 (相談すること)

次の場合は、直ちに服用を中止し、この分包を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合 皮ふ：発疹・発赤、かゆみ 消化器：悪心・嘔吐
(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合



効能・効果

●疲労の回復・予防 ●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい ●病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上)1回1錠、1日1～2回水又は温湯で服用してください。1日2回服用する場合は、服用間隔を6時間以上おいてください。

〈用法・用量に関連する注意〉用法・用量を守ってください。(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください)

成分・分量(2錠中)

エソウコギ乾燥エキス16.0mg(エソウコギとして400.0mg)、オキソアミチン末50.0mg、チアミン硝化物(V.B1) 10.0mg、リボフラビン(V.B2)4.0mg、ピリドキシン塩酸塩(V.B6) 10.0mg、ニコチン酸アミド25.0mg、L-アスコルビン酸ナトリウム112.6mg(L-アスコルビン酸(V.C)として100.0mg)、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム20.7mg(*dl*- α -トコフェロールコハク酸エステル(V.E)として20.0mg)、L-アルギニン塩酸塩60.0mg、無水カフェイン50.0mg

〔添加物〕トウモロコシデンプン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスボドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、タルク、アラビアゴム、炭酸Ca、白糖、セラチン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、リン酸水素Na、酸化チタン、黄色五号、カルナウバロウ

〈成分・分量に関連する注意〉

ビタミンB₂(リボフラビン)により、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、取扱いに注意してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



製造
番号

使用
期限

4 987067 453306

お問い合わせ先 興和(株) お客様相談センター
TEL 03-3279-7755 月～金(祝日を除く)9:00～17:00



製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
H7K