

服薬適性のチェックシート

◆コルゲン^{ユー}αの鎮痛解熱LXαの販売に際しては、下記のチェックシートを用いてお客様の服薬適性のご確認をお願いいたします。

コルゲン^{ユー}αの鎮痛解熱LXαは痛みや熱等の原因になっている「病気」を治療するのではなく、痛みや熱等の「症状」を治療するお薬です。症状があらわれた時のみ服用するようご指導ください。

■ 以下の項目に該当する人は**服用できません**。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 本剤又は**他の解熱鎮痛薬、かぜ薬***を服用してぜんそくを起こしたことがある人
※[他の解熱鎮痛薬、かぜ薬]の具体例は、P.3 及びお客様向け情報提供ツール (P.1「このお薬を服用する前に、確認すべきことは?」)にてご案内しています。
- 15歳未満の小児
- 医療機関で次の治療を受けている人
胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病、心臓病
- 医師から次のような血液異常(血液の病気)を指摘されている人
赤血球数が少ない(貧血)、血小板数が少ない(血が止まりにくい、血が出やすい)、白血球数が少ない等
- 出産予定日12週以内の妊婦**
- 次のいずれかの医薬品を服用している人
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬*、鎮静薬、トラネキサム酸を含有する内服薬

上記に該当しない場合

■ 以下の項目に1つでも該当した人は、本剤の服用に際して**注意が必要です**。
場合によっては**医師又は歯科医師に相談するようご指導ください**。

- 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- 妊婦又は妊娠していると思われる人
- 授乳中の人
- 高齢者
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の診断を受けた人
気管支ぜんそく、潰瘍性大腸炎、クローン病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎)、血栓症を起こす恐れのある人
- 次の病気にかったことのある人
胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病、血液の病気

以上を確認し、適切な服薬指導の上、コルゲン^{ユー}α鎮痛解熱LXαをご販売ください。

■ 本剤の服用時には、以下の点にも注意するようご指導ください。

- 服用前後は飲酒しない
- 長期連続して服用しない**
- 服用後、特に以下の症状があらわれたら、直ちに服用を中止し、添付文書を持って医師等の専門家に相談する
・過度の体温低下、虚脱(力が出ない)、四肢冷却(手足が冷たい)等
・消化性潰瘍(胸やけ、胃もたれ、背中痛み)、むくみ

本剤に関するご相談又はお問い合わせ

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00