

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

本产品根据日本法律进行制造和销售。另外，说明书是由基于日本法律制作的说明书翻译而来，并非遵照日本以外国家的法规。

第②类医药品

请妥善保管此说明书，并在使用时，仔细阅读。

蚊虫叮咬和  
瘙痒治疗药

ウナコーポレーション プレミアムL  
UNA KOWA ACE PREMIUM L

长期使用本产品可能会导致皮肤血管扩张，从而引起皮肤发红和皮肤变薄。脸部皮肤容易发红，请特别注意。请勿用作妆前打底或在剃须后使用本产品。此外，不要在症状改善后随意连续使用。

## 使用上的注意事项

### 禁止事项

(如不遵守容易导致现有症状加重、出现副作用)

- 请勿将本品用于下述部位  
(1)水痘、患有脚气・顽癣等部位或者化脓患处。  
(2)创口部位。  
(3)眼睛及眼睛周围、粘膜等。
- 不要在脸部大范围使用
- 请勿长期连续使用

### 咨询相关事项

- 以下人士使用前请先咨询医生、药剂师或者“登録販売者”  
(1)正接受医生治疗者。  
(2)孕妇或者可能妊娠的妇女。  
(3)对药品等过敏者。  
(4)患处范围较大的人群。  
(5)润湿或糜烂严重的患者。
- 使用后,若出现下列症状则可能是出现了副作用,应立即停止使用,并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

相关部位	症状
皮肤	出疹・发红、瘙痒、肿胀
皮肤(患处)	脚气、顽癣等白癣、粉刺、化脓症状、持续的刺激感

- 当使用5~6天仍不见症状好转时应停止使用,并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

## 成分・分量(1g中)

●泼尼松龙醋酸戊酸酯 3.0mg ●盐酸苯海拉明 20.0mg ●水杨酸乙二醇酯 10.0mg ●l-薄荷醇 35.0mg ●dl-樟脑 10.0mg  
(添加物)依地酸二Na、柠檬酸、苯甲醇、乙醇

## 效能・效果

蚊虫叮咬、瘙痒、湿疹、斑疹、皮炎、疖子、荨麻疹


## 用法・用量

一天数次取适量直接涂抹于患处。

### <用法·用量相关注意事项>

- (1) 请务必遵守用法·用量。
- (2) 儿童必须在监护人的指导监督下，使用。
- (3) 请勿让药液进入眼睛。万一，不慎入眼，请立刻用凉水或者温水进行冲洗。  
此外，如症状加剧，请前往眼科就诊。
- (4) 本品仅限外用。
- (5) 涂抹药物后请勿用保鲜膜等通气性差的物品覆盖患处。使用在尿布接触的部分时，请不要使用贴身的尿布或塑料制等有密封性的裤子。另外，当用于手肘内弯和膝部内侧时，应注意不要使皮肤紧贴在一起(如正坐等情况下)。

### (容器的使用方法)



※本品虽然采用使用感良好，且不易破损的海绵材料，但若使用时药液未充分渗透到海绵中，可能导致海绵层破损，请务必注意。

### 保管及使用上的注意事项

- (1) 请拧紧后放在阴凉的地方保管，避免高温及阳光直射。
- (2) 请放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿放入其他替换容器内。(否则会导致误用及变质。)
- (4) 请勿用沾有本药品的手，接触眼睛等粘膜部位。
- (5) 由于容器可能会因高温而变形，请勿将药品放置于车内等高温场所。容器变形后，可能导致海绵部分脱落或者药液溢出，请务必注意。
- (6) 若不慎将本药品附着并污染了衣物或者寝具时，请尽快用水或洗涤剂冲洗。
- (7) 请注意不要让本品附着在眼镜、钟表、首饰等金属制品、衣物、塑料类、以及地板和家具等物品的涂层上，可能会引发物品变质。
- (8) 请勿接近火源。
- (9) 请勿使用过期(外盒及容器上有记载)药品。



- 被蜂等蛰伤后，如果出现大面积浮肿或肿胀、呼吸困难、恶心、腹泻、发烧等症状，请立即就医。
- 如果症状严重或患部面积大，本产品可能无法处理。在这种情况下，请就医。

制造销售商 兴和株式会社 东京都中央区日本桥本町三丁目4-14

Y1159 M3K B1