

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

本产品根据日本法律进行制造和销售。另外,说明书是由基于日本法律制作的说明书翻译而来,并非遵照日本以外国家的法规。

指定医药部外品

请妥善保管此说明书，并在服用时，仔细阅读。

含维生素的保健品 **キューピーコーワヒーリング錠**
Q&P KOWA HEALING TABLETS

使用上的注意事项

咨询相关事项

- ❶ 以下人士服用前请先咨询医生、药剂师或者“登録販売者”
对药品等过敏者。
- ❷ 服用后，若出现下列症状则可能是出现了副作用，应立即停止服用，并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

相关部位	症状
皮肤	出疹・发红、瘙痒
消化系统	恶心・呕吐

- ❸ 当服用一段时间仍不见症状好转时，应停止服用，并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

效能・效果

恢复及预防疲劳、改善及预防日常生活中因营养不良而产生的身体不适、起床时精神不振、睡眠浅、入睡困难、疲劳无法消除、易疲劳、缺乏体力、身体沉重、身体倦怠、维持及改善体力、身体抵抗力和注意力、病中病愈后体力下降时、发热性消耗性疾病时、食欲不振时、怀孕哺乳期或产前产后等的营养补充

用法・用量

按照下列剂量以常温水或者温开水服用。

年齢	1 次量	1 天服用次数
成人（15 岁以上）	2 片  	1 次
未满 15 岁的儿童	✕ 不可服用	

< 用法・用量相关注意事项 >

请务必严格遵守用法・用量（同时使用其他含有维生素等成分的产品时，请注意避免过量摄入等）。

成分・分量（2 片装）

成分・分量	
刺五加干燥提取物 （相当于刺五加 350mg）	14.0mg
大蒜精华粉末	50.0mg
丁香末	20.0mg
盐酸肉毒碱	50.0mg
γ-谷维素	10.0mg
硫胺素硝化物（V.B ₁ ）	10.0mg
核黄素（V.B ₂ ）	4.0mg
烟酰胺	12.0mg
吡哆醇盐酸盐（V.B ₆ ）	5.0mg
L- 抗坏血酸钠 （相当于 L- 抗坏血酸（V.C）100mg）	112.6mg

〔添加物〕纤维素、玉米淀粉、羟丙基纤维素（HPC）、交聚维酮、硬脂酸 Mg、羟丙甲纤维素、滑石、阿拉伯树胶、碳酸 Ca、白糖、明胶、聚氧乙烯聚氧丙烯二醇、蓝色二号、巴西棕榈蜡

< 成分・分量相关注意事项 >

维生素 B₂（核黄素）有可能造成尿液变黄。

（连接背面）

保管及使用上的注意事项

- ❶ 请拧紧后放在干燥阴凉的地方保管，避免高温及阳光直射。
- ❷ 请放在儿童无法触及的地方。
- ❸ 请勿放入其他替换容器内（否则会导致误用及变质。）。
- ❹ 药片一旦沾水，会导致药片表面变色或者发生龟裂，因此请避免水滴，或湿手触摸。误将药品弄湿时，请将
该药品废弃。
- ❺ 容器中的填塞物(塑料)，可防止运输途中药片破损，打开容器盖后，请务必扔掉。
- ❻ 容器盖若没有盖紧，药品受潮后，则会影响品质，所以服用后请务必拧紧容器盖。
- ❼ 如果容器受到掉落等冲击，药品有可能发生龟裂，从而影响质量，因此请采取放入外盒中保管等措施，小心操作。
- ❽ 请在外盒及标签的“开封年月日”填写栏内，将瓶盖开封后的日期填入。
- ❾ 请勿服用过期(外盒及标签上有记载)药品。此外，药瓶一旦开封，为保证药效请在开封后6个月以内服用。



制造销售商 兴和株式会社 东京都中央区日本桥本町三丁目4-14

Y1416R T3K B1