

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

本產品係依據日本國內法令製造販賣。此外，此說明書為依據日本國內法令規定之說明書的日翻中譯本，並不必然代表遵照日本國外之法令。

指定醫藥部外品

服用前，請詳閱此說明書，並請妥善進行保管。

維他命成分保健品 キューピーコーワヒーリング錠

Q&P KOWA HEALING TABLETS

使用上の注意事項

諮詢

- ①以下人士請於服用前諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」
對藥物等曾發生過敏反應者。
- ②服用後，如出現下列症狀時有可能是副作用所導致，請立即停止服用，並持本說明書諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」

相關部位	症狀
皮膚	發疹・發紅、搔癢
消化器官	噁心・嘔吐
- ③若連續服用一陣子後症狀仍未見改善時請停止服用，並持本說明書諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」

效能・效果

恢復、預防疲勞、改善、預防日常生活的營養不良所伴隨的身體不適、睡不飽、淺眠、入睡困難、疲勞無法消除、容易疲勞、沒有體力、身體沉重、身體倦怠、維持、改善體力或身體抵抗力、集中力、病中病後體力衰弱時、熱性消耗性疾病時、食慾不振時、懷孕哺乳期間或產前產後等的營養補給

用法・用量

請依以下指示，以開水或者溫開水服用。

年齡	一次量	一天服用次數
成人 (15 歲以上)	2 錠 ○○	1 次
未滿 15 歲的孩童	✕ 請勿服用	

< 關於用法・用量的注意事項 >

請嚴守用法・用量 (同時服用其他含有維他命等的產品時，請注意不要攝取過量)。

成分・含量 (2 錠中)

成分・含量	
刺五加乾燥萃取物 (換算刺五加 350mg)	14.0mg
大蒜萃取粉	50.0mg
丁子香粉	20.0mg
氯化卡尼進	50.0mg
γ-穀維素	10.0mg
硝酸硫胺明 (V.B1)	10.0mg
核黃素 (V.B2)	4.0mg
菸鹼醯胺	12.0mg
鹽酸吡哆醇 (V.B6)	5.0mg
L- 抗壞血酸鈉 〔換算 L- 抗壞血酸 (V.C) 100mg〕	112.6mg

〔添加物〕纖維素、玉米澱粉、羥丙基纖維素 (HPC)、聚乙炔聚吡咯烷酮、硬脂酸 Mg、羥丙甲纖維素、滑石、阿拉伯膠、碳酸 Ca、白糖、明膠、聚氧乙炔聚氧丙炔二醇、藍色二號、棕櫚蠟

Ingredients/contents (in 2 tablets)	
Siberian ginseng extract powder (350mg as Siberian ginseng)	14.0mg
Oxoamidine powder	50.0mg
Powdered clove	20.0mg
Carnitine chloride	50.0mg
Gamma-oryzanol	10.0mg
Thiamine nitrate (V.B1)	10.0mg
Riboflavin (V.B2)	4.0mg
Nicotinamide	12.0mg
Pyridoxine hydrochloride (V.B6)	5.0mg
Sodium L-ascorbate [100mg as L-ascorbic acid (V.C)]	112.6mg

[Inactive ingredients] Cellulose, corn starch, hydroxypropyl cellulose, crospovidone, magnesium stearate, hypromellose, talc, gum arabic, calcium carbonate, sucrose, gelatin, polyoxyethylene polyoxypropylene glycol, blue No. 2, carnauba wax

< 關於成分・含量的注意事項 >

維他命 B₂(核黃素) 有時會導致尿液偏黃。

保存及使用上的注意事項

- ❶ 請拴緊瓶蓋並避免高溫及陽光直射，宜保存於乾燥陰涼處。
- ❷ 請保存於孩童不易拿取之處。
- ❸ 請勿將本藥劑移放到其他容器（以避免誤用或者引起品質變化。）。
- ❹ 請勿滴落水滴或以濕手碰觸，以免藥劑沾到水分後，可能導致藥劑表面變色或龜裂。若不慎弄濕藥劑，請將沾有水分的藥劑丟棄。
- ❺ 容器內的填充物（塑膠）是，為了防止錠劑在搬運過程中發生破損，開瓶後，請務必取出丟棄。
- ❻ 容器的瓶蓋若沒有蓋緊，會因受潮等引起變質，所以每次服用後請務必拴緊瓶蓋。
- ❼ 容器掉落等的衝擊，可能會導致藥劑龜裂，進而影響品質，因此請裝進外盒中保存等，並小心使用。
- ❽ 請在外包裝盒及標籤的「開封日期」填寫欄中，填寫開啟瓶蓋的日期。
- ❾ 產品超過使用期限（記載於外包裝盒及標籤）時請勿服用。另外，為確保品質，請在開啟瓶蓋後自開瓶日算起的六個月以內服用。



製造販賣商 興和株式會社 東京都中央區日本橋本町三丁目4-14

Y1416R T3K C1