

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

본 제품은 일본 국내법에 근거하여 제조 판매되었습니다. 또한, 이 첨부문서는 일본 국내법에 근거하여 작성한 첨부문서를 번역한 것으로, 일본 국외의 법규에 준거하는 것이 아닙니다.

제3류 의약품

이 첨부문서는, 복용 시 자세히 읽으시고, 소중히 보관하십시오.

정장·제산건위약 **ザ・ガード_{ゴウ} 整腸錠 α^3**
THE GUARD KOWA INTESTINAL REGULATION TABLETS α^3
(alpha three plus)

사용상의 주의

상담이 필요한 경우

- 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오
(1) 의사의 치료를 받는 사람.
(2) 약에 의해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.
(3) 다음 진단을 받은 사람.
신장병, 갑상선 기능 장애
(4) 항응혈제 '와파린'을 복용하고 있는 사람.
- 복용 후, 다음 증상이 나타난 경우는 부작용 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고, 이 첨부문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움증
소화기	복부 팽만감, 복통, 구역질

- 복용 후, 다음 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 지속 또는 심해질 경우는, 복용을 중지하고, 이 첨부문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오
변비, 설사
- 2주 정도 복용해도 증상이 개선되지 않을 경우에는 복용을 중지하고, 이 첨부문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

용법·용량

아래의 양을 식후마다 물 또는 온수와 함께 복용하십시오.

나이	1회 용량	1일 복용 횟수
성인(15세 이상)	3정 〇〇〇	3회
8세 이상 15세 미만	2정 〇〇	
5세 이상 8세 미만	1정 〇	
5세 미만의 유아	× 복용하지 말 것	

<용법·용량에 관한 주의>

- 용법·용량을 꼭 지키십시오.
- 소아에게 복용시킬 경우에는, 보호자의 지도감독 하에서 복용시켜 주십시오.

효능·효과

정장(변통을 정돈), 묽은변, 변비, 위부·복부 팽만감, 소화불량, 더부룩함, 위장약화, 식욕부진, 과식, 과음, 구역질, 구토, 속쓰림, 가슴이 답답함, 위부불쾌감, 체증, 위산과다, 트림, 위통

성분·분량(9정 중)

성분·분량	
나토균 가루	10mg
락토민(유산균)	30mg
비피더스균	30mg
디메틸폴리실록산	84.6mg
월년초가루	30mg
계피가루	30mg
회향가루	30mg
메틸메티오닌설포늄클로라이드	30mg
침강성탄산칼슘	300mg
수산화마그네슘	300mg
판토텐산칼슘	22.5mg


[첨가물] 유산칼슘, 유당, 하이드록시프로필셀룰로오스, D-솔비톨, 셀룰로오스, 규산칼슘, 규산무수물, 크로스카르멜로오스나트륨, L-멘톨, 스테아린산마그네슘, 감자전분, 이산화규소

<성분·분량에 관한 주의>

메틸메티오닌설포늄클로라이드 등이 배합되어 있어 특유의 냄새가 납니다.

보관 및 취급상의 주의

- ① 고온을 피하여, 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오.
- ② 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ③ 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있음.) 본제의 용기는 건조 기능을 갖게하고 있습니다.
- ④ 수분이 정제에 닿으면, 특유의 냄새가 강해지거나 내용 성분이 변할 수 있으므로, 물방울을 떨어뜨리거나, 젖은 손으로 만지지 마십시오. 실수로 정제를 적신 경우는, 젖은 정제를 폐기하십시오.
- ⑤ 용기 안의 충전물(비닐)은, 수송 중 정제의 파손을 방지하기 위해 넣은 것이므로, 뚜껑을 연 후에는, 반드시 버리십시오.
- ⑥ 용기의 뚜껑을 잘못 닫으면, 습기 등에 의해, 품질에 영향을 줄 수 있으므로, 복용할 때마다 뚜껑을 잘 닫아 주십시오.
- ⑦ 포장용기 및 라벨의 '개봉 연월일' 기입란에, 개봉한 날짜를 기입해 주십시오.
- ⑧ 사용 기한(포장용기 및 라벨에 기재)이 지난 제품은 복용하지 마십시오. 또한, 일단 개봉한 후에는, 품질 유지 측면에서 개봉일로부터 6개월 이내를 기준으로 복용해 주십시오.



발매원 코와주식회사 도쿄도 주오구 니혼바시 혼초 3-4-14

판매제조원 닛토 약품공업 주식회사 교토부 무코시 가미우에노초 미나미비라키 35-3