

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

본 제품은 일본 국내법에 근거하여 제조 판매되었습니다. 또한, 이 첨부문서는 일본 국내법에 근거하여 작성한 첨부문서를 번역한 것으로, 일본 국외의 법규에 준거하는 것이 아닙니다.

제2류 의약품

이 첨부문서는, 복용 시 자세히 읽으시고, 소중히 보관하십시오.

위장약 **キャベジンコーウα顆粒**
CABAGIN KOWA α GRANULATED POWDER

사용상의 주의

금기 사항

(지키지 않을 경우 현재의 증상이 악화되거나, 부작용이 발생하기 쉬워집니다)

①이 약을 복용하는 동안은, 다음 의약품을 복용하지 마십시오

위장진통진경제

②수유 중인 사람은 이 약을 복용하지 말거나, 이 약을 복용할 경우는 수유를 피하십시오

(모유로 이동하여 유아의 맥박이 빨라지는 경우가 있음.)

상담이 필요한 경우

①다음 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

(1) 의사의 치료를 받는 사람.

(2) 임산부 또는 임신 중으로 추정되는 사람.

(3) 고령자.

(4) 약에 의해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.

(5) 다음 증상이 있는 사람.

배뇨 곤란

(6) 다음 진단을 받은 사람.

신장병, 심장병, 녹내장, 갑상선 기능 장애

②복용 후, 다음 증상이 나타난 경우는 부작용 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고, 이 첨부문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움증

③복용 후, 다음 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 지속 또는 심해질 경우는, 복용을 중지하고, 이 첨부문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

임마름

④2주 정도 복용해도 증상이 개선되지 않을 경우에는 복용을 중지하고, 이 첨부문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

기타 주의사항

모유가 잘 나오지 않을 수 있습니다.

효능·효과

위부불쾌감, 위장약화, 더부룩함, 위통, 과식, 과음, 속쓰림, 구역질(메슥거림, 위의 메슥거림, 숙취·숙취로 인한 메슥거림, 토기, 오심), 구토, 식욕부진, 소화불량, 위산과다, 트림, 가슴이 답답함, 소화촉진, 위부·복부 팽만감, 체증

용법·용량

아래의 양을 식후마다 물 또는 온수와 함께 복용하십시오.

나이	1회 용량	1일 복용 횟수
성인(15세 이상)	1포 	3회
11세 이상 15세 미만	2/3포 	
8세 이상 11세 미만	1/2포 	
8세 미만의 소아	☒ 복용하지 말 것	

<용법·용량에 관한 주의>

- ① 용법·용량을 꼭 지키십시오.
- ② 소아에게 복용시킬 경우에는, 보호자의 지도감독 하에서 복용시켜 주십시오.

성분·분량(3포: 3.9g 중)

- 메틸메티오닌설포늄클로라이드 150.0mg ●탄산수소나트륨 700.0mg ●탄산마그네슘 250.0mg
 - 침강성탄산칼슘 1200.0mg ●로트엑기스 3배용산 90.0mg(로트엑기스 30.0mg)
 - 자소염건조엑기스 30.0mg(자소염 270.0mg) ●월년초가루 30.0mg ●비오티아스타제2000 24.0mg
 - 리파아제AP12 15.0mg
- [첨가물] 경화유, 하이드록시프로필셀룰로오스, D-마니톨, 카복시메틸셀룰로오스칼슘, 유산칼슘, 수크랄로스, L-멘톨, 이산화규소, 향료, 옥수수전분, 텍스트린

보관 및 취급상의 주의

- ① 고온을 피하여, 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- ② 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ③ 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있음)
- ④ 1포를 나눈 후 나머지를 복용하는 경우, 봉투 끝을 접어서 보관하고, 2일 이내에 복용하십시오.
- ⑤ 사용 기한(포장용기 및 개별포장에 기재)이 지난 제품은 복용하지 마십시오.

판매제조원 코와주식회사 도쿄도 주오구 니혼바시 혼초 3-4-14

Y1245 H7F D1