



2011年10月
記載要領変更に伴う改訂

第2類医薬品

この添付文書は本剤とともに保管し、
服用の際には、よくお読みください。

胃腸薬 神経性胃炎・慢性胃炎に イラック漢方胃腸薬細粒 (安中散加茯苓製剤)

イラック漢方胃腸薬細粒は、中国の宋の時代から用いられてきた胃腸薬「安中散」にサルノコシカケ科の生薬である茯苓を配合した製剤で、比較的体力が弱っている人の神経性胃炎、慢性胃炎からくる症状によく効きます。

作用と特長

- (1) 胃腸の働きを活発にし、普段から胃腸の弱い人の食欲不振、胸やけ、げっぷなどの症状を抑えます。
- (2) 神経性胃炎からくる胃の痛みにも効果をあらわします。
- (3) 構成生薬末をそのまま用いて製剤化していますので、有効成分が揮発することなく十分に保持されています。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、神経過敏で胃痛又は腹痛があって、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上(大人)	1包	3回
7歳以上15歳未満	2/3包	
4歳以上7歳未満	1/2包	
4歳未満の幼児	服用しないこと	

●食間とは「食事と食事の間」のことで、たとえば朝食と昼食の間のことをさします。食事中に服用するというものではありません。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量(3包:3.6g中)

成分	分量
ケイヒ(桂皮)末	600mg
エンゴサク(延胡索)末	450mg
ボレイ(牡蛎)末	450mg
ウイキョウ(茴香)末	225mg
シュクシャ(縮砂)末	150mg
カンゾウ(甘草)末	150mg
リョウキョウ(良姜)末	75mg
ブクリョウ(茯苓)末	750mg

〔添加物〕乳糖、無水ケイ酸

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限(外箱及び分包に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00



Kowa 発売元 **興和株式会社** 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
DMITO 製造販売元 **ダイト株式会社** 富山県富山市八日町326番地