

かゆみ・虫さされ用薬 プチウナ[®]

第2類医薬品

この台紙は、使用の際にはよく読み、大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと (1)創傷面。(2)目や目の周囲、粘膜等。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



【効能・効果】かゆみ、虫さされ **【用法・用量】**1日回数適量を患部に塗布する。<用法・用量に関連する注意>(1)用法・用量を守ること。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4)外用にのみ使用すること。(5)薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと。また、ひざの裏やひじの内側等に使用する場合は、皮膚を密着(正座等)させないこと。 **【成分・分量】**(1mL中)ジフェンヒドラミン塩酸塩20.0mg リドカイン5.0mg メントール30.0mg dl-カンフル20.0mg (添加物)エト酸Na、クエン酸、エタノール **【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になつたり品質が変わる。)(4)本剤のついた手で、目など粘膜に付けないこと。(5)容器が変形するおそれがあるので、高温になる場所に放置しないこと。容器の変形により、塗布部の脱落や、液もれがおこるおそれがあるので注意すること。(6)本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水が洗剤で洗い落とすこと。(7)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意すること。(8)火気に近づけないこと。(9)使用期限(台紙及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないこと。



製造
番号
使用
期限

T1600 H9K
0000



お問い合わせ先
興和(株)お客様相談センター
TEL 03-3279-7755
月~金(祝日を除く)9:00~17:00

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



<容器の使い方>

キャップをとり、図のように容器を下に向け、先端のボールを転がすようにして患部に塗布してください。
使用後は必ずキャップをしっかりとめてください。

※患部を清潔にしてから使用し、使用后も清潔に保ってください。