

# 生理痛専用薬 エルペイン<sup>コー</sup>

エルペイン<sup>コー</sup>は、生理特有の痛みによく生理痛専用薬です。

## 製品特長

- 「ズキズキする痛み」によくイブプロフェン配合。
- 「ぎゅ〜っとねじれるような痛み」によくブチルスコポラミン臭化物配合。
- 生理特有の痛みに速く、よく効く。
- 眠くなる成分を含まない。
- 1回1錠、小粒でのみやすい。

## このような生理痛の方に

- ズキズキする痛みがある。
- ぎゅ〜っとねじれるような痛みがある。
- お腹のゆるさを伴う「生理痛」。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- ① 次の方は服用しないでください
  - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2)本剤又は解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
  - (3)15歳未満の小児。
  - (4)出産予定日12週以内の妊婦。
  - (5)次の診断を受けた人。緑内障
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
- ④ 服用前後は飲酒しないでください
- ⑤ 長期連用しないでください

### 🗨 相談すること

- ① 次の方は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)授乳中の人。
  - (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5)次の症状のある人。排尿困難
  - (6)次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病
  - (7)次の病気にかかったことのある人。胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃痛、口内炎、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹痛、下痢、血便
精神神経系	めまい、頭痛
循環器	動悸
呼吸器	息切れ
泌尿器	排尿困難
その他	目のかすみ、耳なり、むくみ、鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、背中痛み、過度の体温低下、からだがだるい、異常なまぶしさ、ほてり

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。

肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等があらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。）
心筋梗塞*	しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、冷や汗が出る。*
脳血管障害*	意識の低下・消失、片側の手足が動かしにくくなる、頭痛、嘔吐、めまい、しゃべりにくくなる、言葉が出にくくなる等が急にあらわれる。*
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- ③服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください（便秘、口のかわき）
- ④5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください（子宮に何らかの疾患があることによる生理痛の可能性あります。）

## 効能・効果

生理痛（主に、軟便を伴う下腹部の痛みがある場合）

## 用法・用量

下記の量をなるべく空腹時をさけて水又は温湯で服用してください。  
服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1錠 	3回を限度とする
15歳未満の小児	✕ 服用しないこと	



### <用法・用量に関連する注意>

①用法・用量を厳守してください。②錠剤の取り出し方:上図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

## 成分・分量（1錠中）

●イブプロフェン 150.0mg ●ブチルスコボラミン臭化物 10.0mg  
〔添加物〕乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、無水ケイ酸、クロスカルメロースNa、タルク、トリアセチン、酸化チタン、三二酸化鉄、カルナウバロウ

## 保管及び取扱い上の注意

①高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えしないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）④PTPのアルミ箔が破れたり、中身の錠剤が破損しないように、保管及び携帯に注意してください。⑤使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は服用しないでください。

### 本製品に関するお問い合わせ

お問い合わせのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
受付時間:月～金（祝日を除く）9:00～17:00

Y1884R  
S4K  
00000DM

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



製造販売元

興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

Languages

English

简体字

繁體字

한국어



<https://hc.kowa.co.jp/otc/tenpu>