乗りもの酔い薬 マイトラベル 錠

MYTRAVEL Tablets

乗りもの酔いは、バスや電車、船などの上下の揺れや、横の揺れ、またこれらが組み 合わされた複雑な動揺が耳の奥の方にある三半規管を強く刺激し、神経が過敏となっ て心臓・血管・消化管・呼吸器などに影響を与え、めまいや叶き気、頭痛といった症状 を引き起こします。

マイトラベル錠は、自律神経系に働き、これらの刺激に対する内耳の感受性を低下さ せるとともに、嘔叶中枢の興奮を抑え、叶き気・めまいなどの乗りもの酔いによる症状を 抑えます。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用·事故が起こりやすくなります)

- 介本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を 含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
- 2 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。)
- ❸ 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

|相談すること|

- ♠次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4)次の症状のある人。
 - 排尿困難
 - (5)次の診断を受けた人。 緑内障、てんかん、甲状腺機能障害
- ②服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに 服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して ください

関係部位	症
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
循 環 器	動悸
泌尿器	排尿困難

- ❸服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は 増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師 又は登録販売者に相談してください
 - 口のかわき、眠気

効 能・効 果

用法・用量

乗物酔いの予防には乗車船30分前に下記の1回量を水又は温湯で服用してください。なお、必要に応じて追加服用する場合には1回量を4時間以上の間隔をおき服用してください。1日の総服用回数は3回です。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15歳以上	3錠 000	4時間以上の間隔をおいて
11歳以上15歳未満	2錠 📿	
5歳以上11歳未満	1錠 🕖	3回まで
5歳未満の幼児	★ 服用し	ないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- ② 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 3 錠剤の取り出し方:

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指 先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用 してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道 粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分·分量(3錠中)

成 分	分量	働き
ジフェンヒドラミン サリチル酸塩	45mg	自律神経に働き、乗りもの酔い症状を予防・緩和します。
ジプロフィリン	45mg	揺れによって起こる感覚の混乱を抑制し、乗りもの酔い を予防します。

[添加物]トウモロコシデンプン、乳糖水和物、結晶セルロース、カルメロースCa、ポピドン、タルク、ステアリン酸Ca

保管及び取扱い上の注意

- 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2 小児の手の届かない所に保管してください。
- ❸他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

★ 乗りもの酔いをさけるために、次の点にもご注意ください。★

- ●乗りものに乗る前夜は睡眠を十分にとりましょう。
- ●揺れが少ない席や窓際の席を選びましょう。
- ●飲み過ぎ食べ過ぎはさけましょう。
- ●おしゃべりで気分を楽にしましょう。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566 受付時間:月〜金(祝日を除く)9:00~17:00

●興和製品サイト https://hc.kowa.co.jp/otc

Kowo 発 売 元 **興 和 株 式 會 社** 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14 製造販売元 株式会社パナケイア製薬 〒939-1275 富山県高岡市中田4576番地