[2019年7月 下線部改訂]
第②類医薬品

この添付文書は、服用の際にはよく読み、大切に保管してください。

鎮咳去痰薬

新コルゲンコーワ咳止め透明カプセル

せきは苦しいばかりではなく、長引くとノドや気管支をいためたり、体力を消耗させてしまいます。それに、会議中、乗り物の中など、人がいる所でのせきは、周りの人にまで迷惑をかけてしまう点も困りものです。また、たんはノドにからんで不快なだけでなく、せきを引き起こす一因にもなってしまいます。
新コルゲンコーワ咳止め透明カプセルは、ジヒドロコデインリン酸塩やグアイフェネシンなど、効きめのすぐれた成分を液状にして、小さなカプセルに閉じ込めたお薬です。おのみになりますと、液状成分がいち早く溶け出し、せきやたんの症状がおさまってまいります。

⚠ 使用上の注意

🚫 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

❶ **次の人は服用しないでください**
15歳未満の小児。

❷ **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

❸ **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**
(眠気等があらわれることがあります。)

❹ **授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください**

❺ **過量服用・長期連用しないでください**

相談すること

❶ **次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(6)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

❷ **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症　状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

❸ **服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
便秘、口のかわき、眠気

❹ **5〜6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

(裏面へ続く)

効能・効果

せき、たん

用法・用量

下記の量を水又は温湯で服用してください。
ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

年　齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3カプセル	3回
15歳未満の小児	✖ 服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

❶用法・用量を厳守してください。
❷カプセルの取り出し方：
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

成分・分量（9カプセル中）

成分・分量		働　き
ジヒドロコデインリン酸塩	30.0mg	せきの中枢に直接作用して、せきの発生を抑えます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75.0mg	気管支を拡張して、せきをしずめます。
グアイフェネシン	300.0mg	気道粘液の分泌を促して、たんを出しやすくします。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6.0mg	アレルギーが原因となって起こるせきをしずめます。
安息香酸ナトリウムカフェイン	75.0mg	中枢神経系に作用して、眠気を抑えます。

〔添加物〕ポビドン、マクロゴール、ゼラチン、グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、カラメル

保管及び取扱い上の注意

❶高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
❷小児の手の届かない所に保管してください。
❸他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
❹PTPのアルミ箔が破れたり、中身のカプセルが変形しないように、保管及び携帯に注意してください。
❺使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755　FAX 03-3279-7566
受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00

●興和製品サイト　https://hc.kowa.co.jp/otc

OTC 医薬品

Y1371R
E9K

Kowa 製造販売元 興和株式會社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

0980D