

第3類医薬品

この外箱は、使用の際にはよく読み、大切に保管してください。

外用湿疹・皮膚炎用薬

# 新レスタミン<sup>ユー</sup>軟膏

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### ●成分・分量(1g中)

ジフェンヒドラミン塩酸塩……………20mg [かゆみを抑える]  
〔添加物〕ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ステアリルアルコール、グリセリン、ミリスチン酸オクチルドデシル、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、エデト酸Na、パラベン、クエン酸、水酸化Na

### ●効能・効果

湿疹、皮膚炎、かゆみ、かぶれ、あせも、ただれ、しもやけ、虫さされ、じんましん

## ●用法・用量

1日数回患部に適量を塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。



やわらかい乳剤性軟膏のため、チューブを軽く押して適量を取り出し、お使いください。

※使用後はチューブの口元をきれいにふきとり、乳剤性軟膏がまわりに付着しないように注意してください。  
※使用後は必ずキャップをしっかりとめてください。

## ●保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

### 本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

 製造販売元 興和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

- 本製品には添付文書はついておりません。  
外箱の記載事項と同様のものです。