

エネルギー
代謝改善薬**パニオン^{ユーワ錠}**

パニオンユーワ錠は、アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物（ATP）と4種のビタミンB群を同時配合したお薬です。血流を促進させ、低下したエネルギー代謝を高めます。

このような方に

- 全身倦怠、しびれ、むくみ、めまい、食欲不振、心悸亢進などの年齢やからだの変調などからくる身体各所の不快な症状を感じる方に。
- 疲れがたまっている方に。

⚠ 使用上の注意**相談すること**


- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃腸障害、口内炎
精神神経系	頭痛、眠気、気分が落ち着かない
その他	全身拍動感、耳なり、脱力感

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘
- ④ 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

用法・用量

下記の量を水又は温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠 	3回
15歳未満の小児	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- ① 用法・用量を厳守してください。
- ② 錠剤をかんだり、つぶしたりせずにそのまま服用してください。また、制酸剤又は牛乳と同時に服用しないでください。

効能・効果

- 疲労回復、脚気様症候群(全身倦怠、しびれ、むくみ、めまい、食欲不振、心悸亢進)及び脚気、熱性・消耗性疾患の補助療法
- 神経痛、腰痛、背痛、関節痛、関節炎、五十肩、肩こり

成分・分量(3錠中)

成分・分量	働 き
アデノシン三リン酸 二ナトリウム水和物(ATP) 60.0mg	血流を促進させ、体内の代謝を活性化します。
チアミンジスルフィド(V.B ₁) 24.0mg	ビタミンB群が協力しあって働くことで、栄養素からのエネルギー代謝を促進します。
リボフラビン(V.B ₂) 1.5mg	
ピリドキシン塩酸塩(V.B ₆) 24.0mg	
シアノコバラミン(V.B ₁₂) 0.06mg	

[添加物] ヒドロキシプロピルセルロース、硬化油、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、メタクリル酸共重合体LD、ラウリル硫酸Na、ポリソルベート80、クエン酸トリエチル、タルク、酸化チタン、三二酸化鉄、カルナウバロウ

<成分・分量に関連する注意>

ビタミンB₂(リボフラビン) により、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- ①高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④水分が錠剤につくと、内容成分の変化のもととなりますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。
- ⑤ビンの中の詰め物(ビニール)は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるもので、キャップをあけた後は、必ず捨ててください。
- ⑥ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。
- ⑦使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。



本製品に関するお問い合わせ

お問い合わせのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00

- 興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



製造販売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14