

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

本产品根据日本法律进行制造和销售。另外，说明书是由基于日本法律制作的说明书翻译而来，并非遵照日本以外国家的法规。

第2类医药品

请妥善保管此说明书，并在服用时，仔细阅读。

日本药局方 依巴斯汀片  
过敏专用鼻炎药 **エバステルAL**  
EBASTEL AL

### 使用上的注意事项

#### 禁止事项

(如不遵守容易导致现有症状加重、出现副作用・事故等)

- 以下人士禁止服用
  - 对本药品或者本药品成分过敏者。
  - 未满15岁的儿童。
- 在服用本药品期间，请不要使用以下任何一种医药品  
其他过敏药(包括皮肤病用药、鼻炎用内服药)、含抗组胺药成分的内服药等(感冒药、镇咳祛痰药、晕车药、催眠镇静药等)
- 服用本药品后，请勿开车或者操作机械类工具  
(可能会出现嗜睡等。)
- 哺乳期妇女请勿服用本药品，如需服用本药品请暂停哺乳  
(在动物试验中发现药物渗透至乳汁中。)
- 服用前后请勿饮酒

#### 咨询相关事项

- 以下人士服用前请先咨询医生、药剂师或者“登録販売者”
  - 正接受医生治疗者。
  - 孕妇或者可能妊娠的妇女。
  - 高龄者。
  - 对药品等过敏者。
  - 经诊断有以下疾病者。  
肝功能障碍、支气管哮喘、特应性皮炎
  - 过敏引起的症状或其他原因引起的症状不明显者。
- 服用后，若出现下列症状则可能是出现了副作用，应立即停止服用，并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

相关部位	症状
皮肤	出疹・发红、瘙痒
消化系统	恶心・呕吐、胃部不舒服、腹痛、舌炎
精神神经系统	头晕、失眠、头痛、乏力、麻木感
循环系统	心悸、血压上升
泌尿系统	排尿困难、尿频、糖尿
其他	浮肿、潮热、鼻腔内干燥、胸部压迫感、体重增加、月经异常、脱发、味觉异常

罕有以下严重症状发生。以下情况请立即接受医生的诊疗。

症状名称	症状
休克(过敏反应)	服用后, 立刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、出疹、黄疸(皮肤及眼白发黄)、褐色尿、全身乏力、食欲不振等症状。

3. 服用后, 可能会出现下列症状, 当下列症状持续或者有增强迹象时, 应停止服用, 并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”  
口干、嗜睡、腹泻

## 效能·效果

缓解因花粉、室内尘埃(室内尘)等引起的如下鼻过敏症状: 鼻涕、鼻塞、打喷嚏

## 用法·用量

按照下列剂量在睡前用常温水或者温开水服用。

年龄	1次量	1天服用次数
成人(15岁以上)	1片 $\bigcirc$	1次
未满15岁的儿童	✕不可服用	

### <用法·用量相关注意事项>

- (1) 请务必严格遵守用法·用量。
- (2) 用于花粉等季节性过敏性鼻炎症状时, 如症状是进入花粉飞散期即开始出现, 则在早期症状轻微时服用效果更好。
- (3) 当服用1周左右仍不见症状好转时, 并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”。另外, 即使症状得到了改善但已服用超过2周时, 并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”。
- (4) 药片的取出方法:  
如右图所示用指尖强压装有药片的PTP薄膜的突起部, 弄破背面的铝箔, 然后取出服用。  
(错误直接服用可能会引发刺伤食道粘膜等意外事故。)



## 成分·分量(1片装)

成分·分量
依巴斯汀 5mg

(添加物) 乳糖、纤维素、羟丙基纤维素(HPC)、羧甲基纤维素 Ca、硬脂酸 Mg、无水硅酸、羟丙甲纤维素、聚乙二醇、氧化钛、滑石

## 保管及使用上的注意事项

- (1) 请放在干燥阴凉的地方保管, 避免高温及阳光直射。
- (2) 请放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿放入其他替换容器内。(否则会导致误用及变质。)
- (4) 注意保管及携带, 避免PTP铝箔损坏、药片破损。
- (5) 请勿服用过期(外盒记载)药品。

制造销售商 兴和株式会社 东京都中央区日本桥本町三丁目4-14

Y1277R T7K