

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

本産品係依據日本國內法令製造販賣。此外，此說明書為依據日本國內法令規定之說明書之日翻中譯本，並不必然代表遵照日本國外之法令。

第2類醫藥品

使用前，請詳閱此說明書，並請妥善進行保管。

過敏専用眼薬水

アイフリーAL
EYEFREE KOWA AL

使用上の注意事項

禁止事項

(不遵守注意事項時有可能導致目前症狀惡化，或者容易引發副作用)

以下人士請勿使用

未滿7歳の幼兒。

諮詢

1. 以下人士請於使用前諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」

- (1) 正在接受醫師治療者。
- (2) 孕婦或者是有可能懷孕之婦女。
- (3) 授乳期婦女。
- (4) 對藥物等曾發生過敏反應者。
- (5) 正在接受減敏療法等、過敏治療者。
- (6) 具有以下症狀者。

劇烈眼睛疼痛

(7) 無法判斷症狀是因為過敏所引起或者是因為其他原因所引起者。

尤其是以下情況時由於無法斷定是否為過敏所引起，因此請於使用前諮詢醫師

- 僅有單眼出現症狀時
- 僅有眼睛症狀，鼻子並未出現症狀時
- 視力也有影響的情況下
- 眼屎過多時

2. 使用後，如出現下列症狀時有可能是副作用所導致，請立即停止使用，並持本說明書諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」

相關部位	症狀
皮膚	發疹・發紅、搔癢
眼睛	充血、搔癢*、腫脹*、刺激感*、疼痛*、溢淚

* 包含眼睛周圍

3. 出現下列情況時請停止使用，並持本說明書諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」

- (1) 視力模糊未見改善時。
- (2) 連續使用約一個星期後症狀仍未見改善時。

4. 雖然症狀有所改善，但已連續使用超過兩個星期時也持本說明書諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」

效能・效果

緩解因花粉、粉塵(室內灰塵)等所引起的以下眼睛過敏症狀:眼睛搔癢、眼睛充血、溢淚、異物感(有顆粒滾動的感覺)、視力模糊(眼屎過多時等)

用法・用量

一次1~2滴，一天4次(早、中午、傍晚及就寢前)點藥。

<關於用法・用量的注意事項>

- (1) 請嚴守用法・用量。
- (2) 孩童應在監護人之指導下，使用。
- (3) 請立即擦拭眼睛周圍流出的液體。
- (4) 容器前端若碰觸到眼睛或眼皮、眼睫毛，可能因為眼屎或細菌等而使藥液遭到汙染或有變得混濁，敬請注意。此外，若藥液呈現混濁則請勿繼續使用。
- (5) 請勿作為隱形眼鏡的潤滑液使用。此外，配戴隱形眼鏡時請勿使用。
- (6) 限於滴點於眼睛時使用。
- (7) 使用於花粉症等季節性過敏症狀時，當進入花粉飄散的時期開始出現症狀後，請趁症狀尚輕微時即早使用效果更佳。

成分・含量(1mL中)

成分・含量
阿扎司特水合物 1.08 mg (阿扎司特為 1.0mg)

[賦形劑]乙醇胺、氨基己酸、對羥基苯甲酸酯、三氯叔丁醇、丙二醇、聚山梨酯80、pH調節劑

Ingredients/contents
Acitazanolast hydrate 1.08 mg (1.0 mg as acitazanolast)
[Inactive ingredients] Ethanolamine, aminocaproic acid, paraben, chlorobutanol, propylene glycol, polysorbate 80, pH regulator

保存及使用上的注意事項

- (1) 請拴緊瓶蓋並避免高溫及陽光直射，宜保存於陰涼處。
- (2) 請保存於孩童不易拿取之處。
- (3) 請勿將本藥劑移放到其他容器。(以避免誤用或者引起品質變化。)
- (4) 請勿與他人共用。
- (5) 產品超過使用期限(記載於外包裝盒及標籤)時請勿使用。此外，即使尚未超過使用期限，但為確保品質開封後請趁早使用完畢。

製造販賣商 興和株式會社 東京都中央區日本橋本町三丁目4-14