

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

本产品根据日本法律进行制造和销售。另外，说明书是由基于日本法律制作的说明书翻译而来，并非遵照日本以外国家的法规。

第2类医药品

请妥善保管此说明书，并在使用时，仔细阅读。

过敏专用滴眼药

アイフリーAL  
EYEFREE KOWA AL

## 使用上的注意事项

### 禁止事项

(如不遵守容易导致现有症状加重、出现副作用)

以下人士禁止使用

未满7岁的幼儿。

### 咨询相关事项

1. 以下人士使用前请先咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

- (1) 正接受医生治疗者。
- (2) 孕妇或者可能妊娠的妇女。
- (3) 哺乳期妇女。
- (4) 对药品等过敏者。
- (5) 正在接受脱敏疗法等、治疗过敏者。
- (6) 有以下症状者。

剧烈眼部疼痛

(7) 过敏引起的症状或其他原因引起的症状不明显者。

尤其是如下情形时由于无法断定是否过敏引起，因此使用前请先咨询医生

- 仅一只眼有症状时
- 仅有眼部症状，没有鼻部症状时
- 对视力也有影响时
- 眼眵较多时

2. 使用后，若出现下列症状则可能是出现了副作用，应立即停止使用，并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

相关部位	症状
皮肤	出疹・发红、瘙痒
眼睛	充血、瘙痒*、肿胀*、刺激感*、疼痛*、流泪

\*包括眼部周围

3. 如下情况时应停止使用，并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

- (1) 视觉模糊未得到改善时。
- (2) 使用1周左右仍不见症状好转时。

4. 即使症状得到了改善但已使用超过2周时，携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

## 效能・效果

缓解因花粉、室内尘埃(室内尘)等引起的如下眼过敏症状:眼瘙痒、眼充血、流泪、异物感(有颗粒滚动感)、视觉模糊(眼眵多时等)

## 用法・用量

1次1~2滴, 1天4次(早、中、晚及睡前)用药。

### <用法・用量相关注意事项>

- (1)请务必严格遵守用法・用量。
- (2)儿童必须在监护人的指导监督下,使用。
- (3)请立即擦去眼睛周围流出的液体。
- (4)容器的突出部如触及眼睛或眼睑、睫毛, 眼眵或细菌等可能使药液受到污染或变得浑浊, 请务必注意。另外, 请勿使用已变得浑浊的药液。
- (5)请勿将本药液当作隐形眼镜的护理液使用。另外, 请勿在佩戴隐形眼镜时使用。
- (6)本品仅用于滴眼。
- (7)用于花粉等季节性过敏引起的症状时, 如症状是进入花粉飞散期即开始出现, 则在早期症状轻微时使用效果更好。

## 成分・分量(1mL中)

成分・分量
阿扎司特水合物 1.08 mg(阿扎司特为 1.0mg)

(添加物) 乙醇胺、氨基己酸、对羟基苯甲酸酯、氯丁醇、丙二醇、聚山梨酸酯 80、pH 调节剂

## 保管及使用上的注意事项

- (1)请拧紧后放在阴凉的地方保管, 避免高温及阳光直射。
- (2)请放在儿童无法触及的地方。
- (3)请勿放入其他替换容器内。(否则会导致误用及变质。)
- (4)请勿和他人共用。
- (5)请勿使用过期(外盒及标签上有记载)药品。此外, 即使在使用期限内, 出于保持品质的考量开封后请尽快使用。

制造销售商 兴和株式会社 东京都中央区日本桥本町三丁目4-14