

第2類医薬品

この台紙は、使用の際にはよく読み、大切に保管してください。

かゆみ・虫さされ用薬

プチウナ_{ユ-フ}

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 創傷面。
- (2) 目や目の周囲、粘膜等。

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

● 効能・効果

かゆみ、虫さされ

● 成分・分量(1mL中)

ジフェンヒドラミン塩酸塩20.0mg リドカイン5.0mg l-メントール30.0mg

dI-カンフル20.0mg


[添加物] エデト酸Na、クエン酸、エタノール

● 用法・用量

1日数回適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。また、ひざの裏やひじの内側等に使用する場合は、皮膚を密着(正座等)させないでください。



※患部を清潔にしてから使用し、使用後も清潔に保ってください。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (5)容器が変形するおそれがありますので、車の中など、高温になる場所に放置しないでください。容器の変形により、塗布部の脱落や、液もれがおこるおそれがありますので注意してください。
- (6)本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落としてください。
- (7)メガネ、時計、アクセサリなどの金属類、衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (8)火気に近づけないでください。
- (9)使用期限(台紙及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。



本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

 製造販売元 興和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

- 本製品には添付文書はついておりません。
台紙の記載事項と同様のものです。