

ビタミン含有保健薬

滋養強壮・
肉体疲労時の栄養補給

キューピーコーワゴールドA

過酷な通勤地獄や車の運転、スケジュールに追われる仕事、エアコンによる体の変調など、現代人の体への負担は切れ目なく続き、これが疲れとなって体内に蓄積されて、体に重くのしかかってきます。この種の疲れは、なかなか抜けず、ひと晩寝てもとれないのが特徴と言えます。

こうした現代型の体の疲れをとり除くためには、「疲れにすぐれた効きめをあらわす成分をどのように補給すればよいかを研究し、これを1錠中にいかに配合するか」が重要なポイントになってきます。キューピーコーワゴールドAは、この考え方に基づいてつくられたお薬で、疲れにすぐれた効きめをあらわす成分、L-アルギニン塩酸塩とガンマー-オリザノール、さらにはニンニクの抽出成分(オキソアミジン末)と7種のビタミンを同時配合いたしました。

1回わずか1錠。しかも1日1回か2回の服用で、体の疲れによく効くように出来ております。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。
(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告があります。)

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

下記の量を水又は温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠	1~2回
15歳未満の小児	服用しないこと	

●朝・昼・晩、食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。

(1日2回服用する場合は、1回目の服用から6時間以上間隔をあけられることをおすすめします。)

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

(他のビタミン等を含有する製剤を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

成分・分量(2錠中)

成分・分量		働 き
L-アルギニン塩酸塩	50.0mg	アミノ酸の一種で、体に元気がない時、エネルギー源の合成・貯蔵を促進します。
ガンマ-オリザノール	10.0mg	ビタミン様物質といわれ、体調が悪い時や疲れている時にすぐれた効きめがあらわれます。
オキソアミジン末	50.0mg	ニンニクから抽出された成分で、ニンニク特有のニオイがほとんどなく、体の調子が悪い時、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。
チアミン硝化物(V.B ₁)	10.0mg	疲れた体に必要な7種のビタミンが補給され、栄養物のエネルギー化を促します。
リボフラビン(V.B ₂)	4.0mg	
ピリドキシン塩酸塩(V.B ₆)	10.0mg	
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(V.E)	20.7mg	
ビタミンA油(V.A)	2.0mg	
(2000ビタミンA単位)		
L-アスコルビン酸ナトリウム(V.C)	112.6mg	
ニコチン酸アミド	25.0mg	
無水カフェイン	50.0mg	中枢神経に働いて、疲れに効きます。

[添加物]セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、硬化油、タルク、ヒプロメロース、炭酸Ca、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、酸化チタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、リン酸水素Na、カルナウバロウ、黄色五号

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB₂(リボフラビン)によるものですから心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるもので、キャップをあけた後は必ず捨ててください。
- (6) 容器の落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、外箱に入れて保管するなど、取扱いに注意してください。
- (7) 外箱及びラベルの「開封年月日」記入欄に、キャップをあけた日付を記入してください。
- (8) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度キャップをあけた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。



本製品に関するお問い合わせは
 興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
 TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
 電話受付時間：月～金（祝日を除く）9：00～17：00

Y1285R
 S3F
 3960DM