

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

本产品根据日本法律进行制造和销售。另外，说明书是由基于日本法律制作的说明书翻译而来，并非遵照日本以外国家的法规。

第②类医药品

请妥善保管此说明书，并在服用时，仔细阅读。

止泻药 トメダイン[®]フィルム

TOMEDAIN KOWA FILM

使用上的注意事项

禁止事項

(如不遵守容易导致现有症状加重、出现副作用・事故等)

- 以下人士禁止服用
(1) 对本药品或者本药品成分过敏者。
(2) 未满15岁的儿童。
- 在服用本药品期间，请不要服用以下医药品
肠胃镇痛解痉药
- 服用本药品后，请勿开车或者操作机械类工具
(可能会出现嗜睡等。)
- 服用前后请勿饮酒

咨询相关事項

- 以下人士服用前请先咨询医生、药剂师或者“登録販売者”
(1) 正接受医生治疗者。
(2) 腹泻并伴有发热者、拉血便者或者持续拉粘液便者。
(3) 急性剧烈腹泻或者腹泻并伴有腹痛・腹胀・恶心等症状者。
(本药品虽然可以强行止泻但可能会导致病情恶化。)
 - (4) 有必须避免便秘的肛门疾患等情况的患者。
(服用本药品后可能会出现便秘。)
 - (5) 孕妇或者可能妊娠的妇女。
 - (6) 哺乳期妇女。
 - (7) 高龄者。
 - (8) 对药品等过敏者。
 - (9) 有以下症状者。
口干(口中过于干燥致使本药品无法停留在舌头上的状态)
- 服用后，若出现下列症状则可能是出现了副作用，应立即停止服用，并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

相关部位	症状
皮肤	出疹・发红、瘙痒
消化系统	食欲不振、腹痛、恶心、腹胀、便秘、腹部不舒服、呕吐
精神神经系统	头晕

罕有以下严重症状发生。以下情况请立即接受医生的诊疗。

症状名称	症状
休克(过敏反应)	服用后，立刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。
皮肤黏膜眼综合征 (史蒂文斯・约翰逊综合征)、 中毒性表皮坏死松解症	高烧、眼充血、眼眵、嘴唇溃烂、喉咙疼痛、皮肤大范围出疹・发红等持续、急剧恶化。

(连接背面)

肠梗阻症状

剧烈腹痛、停止排气(即放屁)、呕吐、腹胀并伴有严重便秘。

3. 服用后, 可能会出现下列症状, 当下列症状持续或者有增强迹象时, 应停止服用, 并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

嗜睡

4. 当服用2~3天仍不见症状好转时应停止服用, 并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

效能·效果

暴食·饮酒过量引起的腹泻、睡觉着凉引起的腹泻

用法·用量

按照下列剂量在口中溶化后服用。但是, 服用间隔时间应在4小时以上。

此外, 止泻后请勿服用。

年龄	1次量	1天服用次数
成人(15岁以上)	1片	2次
未满15岁的儿童	✕不可服用	

<用法·用量相关注意事项>

(1) 请务必严格遵守用法·用量。

(2) 按照下列方式服用本药品(膜剂)。



(3) 本药品(膜剂)入口即化, 万一, 黏在喉咙处请用水吞服。此外, 唾液较少无法服用时请将水含在口中, 待溶化后服用。

成分·分量(2片装)

成分·分量	
盐酸洛哌丁胺	1.0 mg

(添加物)羟丙甲纤维素、羟丙基纤维素(HPC)、麦芽糖醇糖浆、聚乙二醇、氧化钛、糖精 Na、l-薄荷醇、黄色五号、香料、乙醇

保管及使用上的注意事项

(1) 请放在干燥阴凉的地方保管, 避免高温及阳光直射。

(2) 请放在儿童无法触及的地方。

(3) 请勿放入其他替换容器内。(否则会导致误用及变质。)

(4) 注意保管及携带, 避免铝箔和其中的膜剂破损。

(5) 铝箔开封后请尽快服用。

(6) 请勿服用过期(记载于外盒及铝箔上)药品。

制造销售商 兴和株式会社 东京都中央区日本桥本町三丁目4-14