

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

本产品根据日本法律进行制造和销售。另外，说明书是由基于日本法律制作的说明书翻译而来，并非遵照日本以外国家的法规。

第②类医药品

请妥善保管此说明书，并在服用时，仔细阅读。

止泻药 **トメダイン** ユーブ錠
TOMEDAIN KOWA TABLET

使用上的注意事项

禁止事项

(如不遵守容易导致现有症状加重、出现副作用・事故等)

- 以下人士禁止服用
对本药品或者本药品成分过敏者。
- 在服用本药品期间，请不要服用以下医药品
肠胃镇痛解痉药
- 服用本药品后，请勿开车或者操作机械类工具
(可能会出现嗜睡等。)
- 服用前后请勿饮酒

咨询相关事项

- 以下人士服用前请先咨询医生、药剂师或者“登録販売者”
 - 正接受医生治疗者。
 - 腹泻并伴有发热者、拉血便者或者持续拉粘液便者。
 - 急性剧烈腹泻或者腹泻并伴有腹痛・腹胀・恶心等症状者。
(本药品虽然可以强行止泻但可能会导致病情恶化。)
 - 有必须避免便秘的肛门疾患等情况的患者。
(服用本药品后可能会出现便秘。)
 - 孕妇或者可能妊娠的妇女。
 - 哺乳期妇女。
 - 高龄者。
 - 对药品等过敏者。
- 服用后，若出现下列症状则可能是出现了副作用，应立即停止服用，并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

相关部位	症状
皮肤	出疹・发红、瘙痒
消化系统	食欲不振、腹痛、恶心、腹胀、便秘、腹部不舒服、呕吐
精神神经系统	头晕

罕有以下严重症状发生。以下情况请立即接受医生的诊疗。

症状名称	症状
休克(过敏反应)	服用后，立刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。
皮肤黏膜眼综合征 (史蒂文斯・约翰逊综合征)、 中毒性表皮坏死松解症	高烧、眼充血、眼眵、嘴唇溃烂、喉咙疼痛、皮肤大范围出疹・发红等持续、急剧恶化。
肠梗阻症状	剧烈腹痛、停止排气(即放屁)、呕吐、腹胀并伴有严重便秘。

3.服用后，可能会出现下列症状，当下列症状持续或者有增强迹象时，应停止服用，并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

嗜睡

4.当服用2~3天仍不见症状好转时应停止服用，并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

效能・效果

腹泻、暴食・饮酒过量引起的腹泻、睡觉着凉引起的腹泻、腹痛并伴有腹泻、食物中毒、水中毒、软便

用法・用量

按照下列剂量以常温水或者温开水服用。但是，止泻后请勿服用。

此外，服用间隔时间应在4小时以上。

年齢	1次量	1天服用次数
成人(15岁以上)	3片 ○○○	2次
未满15岁的儿童	✕ 不可服用	

<用法・用量相关注意事项>

(1)请务必严格遵守用法・用量。

(2)药片的取出方法：

如右图所示用指尖强压装有药片的PTP薄膜的突起部，弄破背面的铝箔，然后取出服用。(错误直接服用可能会引发刺伤食道粘膜等意外事故。)



成分・分量(6片装)

成分・分量	
盐酸洛哌丁胺	1.0 mg
盐酸黄连素水合物	80.0 mg
利凡诺水合物	80.0 mg
芍药粉	200.0 mg
老鹤草粉	300.0 mg

(添加物) 乳糖、纤维素、交联羧甲基纤维素Na、羟丙基纤维素(HPC)、硅酸Ca、硬脂酸Mg、羟丙甲纤维素、三乙酸甘油、滑石、氧化钛、黄色五号、巴西棕榈蜡

保管及使用上的注意事项

(1)请放在干燥阴凉的地方保管，避免高温及阳光直射。

(2)请放在儿童无法触及的地方。

(3)请勿放入其他替换容器内。(否则会导致误用及变质。)

(4)注意保管及携带，避免PTP铝箔损坏、药片破损。

(5)请勿服用过期(外盒记载)药品。

制造销售商 兴和株式会社 东京都中央区日本桥本町三丁目4-14

Y1280R H6K B1