

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

## 一般用医薬品「使用上の注意」改訂のお知らせ

2022年10月  
製造販売元 興和株式会社

### 第1類医薬品

### 解熱鎮痛薬 コルゲンコーワ鎮痛解熱L X α

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しましたので、ご案内申し上げます。  
この製品を販売いただく際には、情報提供、注意喚起をしていただきますようお願い申し上げます。  
なお、改訂内容を反映した製品がお手元に届くまでには流通在庫の関係から日時を要しますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

#### 記

#### 1. 改訂内容（下線部：追記）

改訂後	改訂前																
<b>相談すること</b> ①（省略） ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください （省略） まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 <table border="1"><thead><tr><th>症状の名称</th><th>症状</th></tr></thead><tbody><tr><td>（省略）</td><td>（省略）</td></tr><tr><td>皮膚粘膜眼症候群（ステイブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症</td><td>高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。</td></tr><tr><td>（省略）</td><td>（省略）</td></tr></tbody></table>	症状の名称	症状	（省略）	（省略）	皮膚粘膜眼症候群（ステイブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。	（省略）	（省略）	<b>相談すること</b> ①（省略） ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください （省略） まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 <table border="1"><thead><tr><th>症状の名称</th><th>症状</th></tr></thead><tbody><tr><td>（省略）</td><td>（省略）</td></tr><tr><td>皮膚粘膜眼症候群（ステイブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、多形紅斑</td><td>高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる等が持続したり、急激に悪化する。</td></tr><tr><td>（省略）</td><td>（省略）</td></tr></tbody></table>	症状の名称	症状	（省略）	（省略）	皮膚粘膜眼症候群（ステイブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、多形紅斑	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる等が持続したり、急激に悪化する。	（省略）	（省略）
症状の名称	症状																
（省略）	（省略）																
皮膚粘膜眼症候群（ステイブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。																
（省略）	（省略）																
症状の名称	症状																
（省略）	（省略）																
皮膚粘膜眼症候群（ステイブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、多形紅斑	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる等が持続したり、急激に悪化する。																
（省略）	（省略）																
③（省略）	③（省略）																
④（省略）	④（省略）																

#### 2. 改訂理由

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知（令和4年10月12日付 薬生安発1012第1号）が発出され、ロキソプロフェンナトリウム水和物含有製剤（経口剤）の「使用上の注意」の改訂指示がありました。この指示に基づき、「使用上の注意」を改訂致しました。

本製品に関するお問い合わせは  
興和株式会社 医薬事業部  
お客様相談センターへお願い致します。  
TEL 03-3279-7755  
受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00