

2錠入り



服用に際しては、この分包を  
よくお読みください。

## キューピーコーワヒーリング

### 使用上の注意 (相談すること)

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この分包を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
皮膚：発疹・発赤、かゆみ 消化器：吐き気・嘔吐
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この分包を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

### 用法・用量

成人(15歳以上)1回2錠、1日1回水又は湯で服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉用法・用量を守ってください(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

### 成分・分量(2錠中)

エソコギ乾燥エキス8.0mg(エソコギとして200.0mg)、カルニチン塩化物50.0mg、ガンマ-オリザノール10.0mg、オキソアミチン末50.0mg、チアミン塩化物(V.B<sub>1</sub>)10.0mg、リボフラビン(V.B<sub>2</sub>)4.0mg、ピリドキシン塩酸塩(V.B<sub>6</sub>)5.0mg、ニコチン酸アミド12.0mg、L-アスコルビン酸ナトリウム112.6mg(L-アスコルビン酸(V.C)として100.0mg)、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム20.7mg(*dl*- $\alpha$ -トコフェロールコハク酸エステル(V.E)として20.0mg)

〔添加物〕ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、炭酸Ca、タルク、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体、ポリオキエチレンノニルフェニルエーテル、赤色三号、赤色一〇六号、黄色五号、マクロゴール、カルナウハロウ

### 〈成分・分量に関連する注意〉

ビタミンB<sub>2</sub>(リボフラビン)により、尿が黄色になることがあります。

### ▶ 保管及び取扱い上の注意

- 開  
け  
口
- (1) 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
  - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
  - (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
  - (4) 落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、取扱いに注意してください。
  - (5) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



製造  
番号

使用  
期限

お問い合わせ先 興和(株) お客様相談センター  
TEL 03-3279-7755 月~金(祝日を除く)9:00~17:00



製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
R7K①