

この分包は、服用の際にはよく読み、大切に保管してください。

ビタミン含有保健薬

キューピーコーワゴールドA

【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。
(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告があります。)
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この分包を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1錠、1日1～2回水又は温湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を守ってください。(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

【成分・分量(2錠中)】

L-アルギニン塩酸塩 50.0mg

ガンマ-オリザノール 10.0mg

オキソアミジン末 50.0mg

チアミン硝化物(V.B₁) 10.0mg

リボフラビン(V.B₂) 4.0mg

ピリドキシン塩酸塩(V.B₆) 10.0mg

トコフェロールコハク酸エステルカルシウム 20.7mg [*dl*- α -トコフェロールコハク酸エステル(V.E)として 20mg]

ビタミンA油(V.A) 2.0mg(2000ビタミンA単位)

L-アスコルビン酸ナトリウム 112.6mg [L-アスコルビン酸(V.C)として 100mg]

ニコチン酸アミド 25.0mg

無水カフェイン 50.0mg

〔添加物〕セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、硬化油、タルク、ヒプロメロース、炭酸Ca、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、酸化チタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、リン酸水素Na、カルナウバロウ、黄色五号、トウモロコシ油、BHT

<成分・分量に関連する注意>

ビタミンB₂(リボフラビン)により、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、取扱いに注意してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

受付時間：月～金（祝日を除く）9：00～17：00

 製造販売元 興和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

- 本製品には添付文書はついておりません。
分包の記載事項と同様のものです。