

指定医薬部外品

この外箱は、使用の際にはよく読み、大切に保管してください。

口腔咽喉薬

コルゲン्यूットローチ

販売名: 新コルゲン्यूットローチA

●使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
 - 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

●効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ・のどのあれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

●用法・用量

下記の量を口の中でかまずにできるだけゆっくり溶かして用いてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1個	4～5回
小児(5歳以上15歳未満)	1個	2～3回

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。
- トローチの取り出し方:右図のようにトローチの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して使用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



●成分・分量(5個中)

グリチルリチン酸二カリウム	15.0mg	のどの炎症を抑えて、はれを緩和する。
セチルピリジニウム塩化物水和物	5.0mg	口腔内やのどを殺菌・消毒する。
セネガ乾燥エキス	23.95mg (セネガとして400mg)	のどを潤し、不快感をやわらげる。

[添加物]ブドウ糖、白糖、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、黄色五号、デキストリン、*l*-メントール、香料、ステアリン酸Mg

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤には生薬が配合されていますので、製品により色が多少異なることがあります。

●保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)PTPのアルミ箔が破れたり、中身のトローチが破損しないように、保管及び携帯に注意してください。
- (5)使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00

製造販売元



興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

- 本製品には添付文書はついておりません。
外箱の記載事項と同様のものです。