

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

本产品根据日本法律进行制造和销售。另外,说明书是由基于日本法律制作的说明书翻译而来,并非遵照日本以外国家的法规。

第3类医药品

请妥善保管此说明书,并在服用时,仔细阅读。

整肠・抗胃酸健胃药 **ザ・ガード** 整腸錠 α^3+

THE GUARD KOWA INTESTINAL REGULATION TABLETS α^3+
(alpha three plus)

使用上の注意事項



咨询相关事项

- 以下人士服用前请先咨询医生、药剂师或者“登録販売者”
 - 正接受医生治疗者。
 - 对药品等过敏者。
 - 经诊断有以下疾病者。
肾病、甲状腺功能障碍
 - 正在服用抗凝剂“华法林”者。
- 服用后,若出现下列症状则可能是出现了副作用,应立即停止服用,并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

相关部位	症状
皮肤	出疹・发红、瘙痒
消化系统	腹胀、腹痛、想吐
- 服用后,可能会出现下列症状,当下列症状持续或者有增强迹象时,应停止服用,并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”
便秘、腹泻
- 当服用2周左右仍不见症状好转时应停止服用,并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

用法・用量

按照下列剂量在饭后以常温水或者温开水服用。

年齢	1次量	1天服用次数
成人(15岁以上)	3片   	3次
8岁以上未满15岁	2片  	
5岁以上未满8岁	1片 	
未满5岁的幼儿	× 不可服用	

<用法・用量相关注意事项>

- 请务必严格遵守用法・用量。
- 儿童必须在监护人的指导监督下,服用。

效能・效果

整肠(调节通便)、软便、便秘、胃胀・腹胀、消化不良、胃胀、胃功能消化性不良、食欲不振、暴食、饮酒过量、想吐、呕吐、烧心、胸闷、胃部不舒服、胃下垂、胃酸过多、打嗝、胃痛

成分·分量 (9片装)

成分·分量	
纳豆菌粉	10mg
表飞鸣 (乳酸菌)	30mg
双叉乳酸杆菌	30mg
二甲基聚硅氧烷	84.6mg
千振粉末	30mg
桂皮粉末	30mg
茴香粉末	30mg
维生素 U	30mg
沉降碳酸钙	300mg
氢氧化镁	300mg
泛酸钙	22.5mg


(添加物) 乳酸 Ca、乳糖、羟丙基纤维素 (HPC)、D- 山梨醇、纤维素、硅酸 Ca、无水硅酸、交联羧甲基纤维素 Na、l- 薄荷醇、硬脂酸 Mg、马铃薯淀粉、二氧化硅

< 成分·分量相关注意事项 >

含有维生素 U 等成分，具有特殊气味。

保管及使用上的注意事项

- ❶ 请拧紧后放在干燥阴凉的地方保管，避免高温及阳光直射。
- ❷ 请放在儿童无法触及的地方。
- ❸ 请勿放入其他替换容器内。(否则会导致误用及变质。) 该剂的容器具有干燥剂的功能。
- ❹ 药片一旦沾水，会转化成带有特殊强烈气味的物质成分，因此请避免水滴，或湿手触摸。
误将药品弄湿时，请将该药品废弃。
- ❺ 容器中的填塞物(塑料)可防止运输途中药片破损，打开瓶盖后，请务必扔掉。
- ❻ 容器盖若没有盖紧，药品受潮后，则会影响品质，所以服用后请务必拧紧瓶盖。
- ❼ 请在外盒及标签的“开封年月日”填写栏内，将瓶盖开封后的日期填入。
- ❽ 请勿服用过期(外盒及标签上有记载)药品。此外，药瓶一旦开封，为保证药效请在开封后 6 个月以内服用。



发行商 兴和株式会社 东京都中央区日本桥本町三丁目 4-14
制造销售商 日东药品工业株式会社 京都府向日市上植野町南开 35-3