

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

一般用医薬品「使用上の注意」改訂のお知らせ

2024年10月
製造販売元 興和株式会社

第②類医薬品 総合かぜ薬 コルゲンコーワIB錠TX α

この度、標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂致しましたので、ご案内申し上げます。
この製品を販売いただく際には、情報提供、注意喚起をしていただきますようお願い申し上げます。
なお、改訂内容を反映した製品がお手元に届くまでには流通在庫の関係から日時を要しますので、
何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

記

1. 改訂内容（下線部：追記）

改訂後	改訂前																								
<p>相談すること</p> <p>①（省略）</p> <p>②（省略）</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p>	<p>相談すること</p> <p>①（省略）</p> <p>②（省略）</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p>																								
<table border="1"><thead><tr><th>症状の名称</th><th>症状</th></tr></thead><tbody><tr><td>（省略）</td><td>（省略）</td></tr><tr><td>無菌性髄膜炎</td><td>首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等があらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。）</td></tr><tr><td>心筋梗塞</td><td>しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、冷や汗が出る。</td></tr><tr><td>脳血管障害</td><td>意識の低下・消失、片側の手足が動かしにくくなる、頭痛、嘔吐、めまい、しゃべりにくくなる、言葉が出にくくなる等が急にあらわれる。</td></tr><tr><td>間質性肺炎</td><td>階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。</td></tr><tr><td>（省略）</td><td>（省略）</td></tr></tbody></table>	症状の名称	症状	（省略）	（省略）	無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等があらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。）	心筋梗塞	しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、冷や汗が出る。	脳血管障害	意識の低下・消失、片側の手足が動かしにくくなる、頭痛、嘔吐、めまい、しゃべりにくくなる、言葉が出にくくなる等が急にあらわれる。	間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。	（省略）	（省略）	<table border="1"><thead><tr><th>症状の名称</th><th>症状</th></tr></thead><tbody><tr><td>（省略）</td><td>（省略）</td></tr><tr><td>無菌性髄膜炎</td><td>首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等があらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。）</td></tr><tr><td>間質性肺炎</td><td>階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。</td></tr><tr><td>（省略）</td><td>（省略）</td></tr></tbody></table>	症状の名称	症状	（省略）	（省略）	無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等があらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。）	間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。	（省略）	（省略）
症状の名称	症状																								
（省略）	（省略）																								
無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等があらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。）																								
心筋梗塞	しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、冷や汗が出る。																								
脳血管障害	意識の低下・消失、片側の手足が動かしにくくなる、頭痛、嘔吐、めまい、しゃべりにくくなる、言葉が出にくくなる等が急にあらわれる。																								
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。																								
（省略）	（省略）																								
症状の名称	症状																								
（省略）	（省略）																								
無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等があらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。）																								
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。																								
（省略）	（省略）																								
③（省略）	③（省略）																								
④（省略）	④（省略）																								

2. 改訂理由

厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知（令和6年10月8日付 医薬安発 1008 第1号）が発出され、イブプロフェン含有製剤（一般用医薬品）の「使用上の注意」の改訂指示がありました。この指示に基づき、「使用上の注意」を改訂いたします。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部
お客様相談センターへお願いします。
TEL 03-3279-7755
受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00