

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

本产品根据日本法律进行制造和销售。另外，说明书是由基于日本法律制作的说明书翻译而来，并非遵照日本以外国家的法规。

[*: 2024年10月 下划线部修订]

第②类医药品

请妥善保管此说明书，并在服用时，仔细阅读。

综合感冒药 **コルゲン^{ユー}IB錠 TX α**
COLGEN KOWA IB TABLET TX α

使用上的注意事项

禁止事项

(如不遵守容易导致现有症状加重、出现副作用・事故等)

1. 以下人士禁止服用

- (1) 对本药品或者本药品成分过敏者。
- (2) 有服用本药品或者其他感冒药、解热镇痛药引起哮喘的患者。
- (3) 未满 15 岁的儿童。
- (4) 正在医疗机构因下列疾病接受治疗或者服用医药品的患者。
胃溃疡・十二指肠溃疡、血液疾病、肝病、肾病、心脏病、高血压、正在服用叠氮胸苷(齐多夫定)的患者
- (5) 距预产期 12 周以内的孕妇。

2. 在服用本药品期间，请不要使用以下任何一种医药品

其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺药成分的内服药等(鼻炎用内服药、晕车药、过敏药等)、含有凝血酸成分的内服药

3. 服用本药品后，请勿开车或者操作机械类工具(可能会出现嗜睡等。)

4. 哺乳期妇女请勿服用本药品，如需服用本药品请暂停哺乳

5. 服用前后请勿饮酒

6. 用药请勿超过 5 天

咨询相关事项

1. 以下人士服用前请先咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

- (1) 正接受医生或者牙科医生治疗者。
- (2) 孕妇或者可能妊娠的妇女。
- (3) 高龄者。
- (4) 对药品等过敏者。
- (5) 有以下症状者。高烧、排尿困难
- (6) 经诊断有以下疾病者。 甲状腺功能障碍、糖尿病、青光眼、全身性红斑狼疮、混合性结缔组织病、有血栓的人群(脑血栓、心肌梗塞、血栓性静脉炎)、有引发血栓可能的人群、支气管哮喘、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症
- (7) 患有下列疾病的患者。 胃溃疡・十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎、节段性回肠炎、血液疾病、肝病、肾病

2. 服用后，若出现下列症状则可能是出现了副作用，应立即停止服用，并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

相关部位	症状
皮肤	出疹・发红、瘙痒
消化系统	恶心・呕吐、食欲不振、胃部不舒服、胃痛、口腔炎、烧心、胃胀、肠胃出血、腹痛、腹泻、胃胀・腹胀
精神神经系统	头晕、失眠、心情郁闷
循环系统	心悸
呼吸系统	气喘
泌尿系统	排尿困难
其他	视觉模糊、耳鸣、浮肿、脊背疼痛、麻木感

罕有以下严重症状发生。以下情况请立即接受医生的诊疗。

症状名称	症状
休克(过敏反应)	服用后，立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。

(连接背面)

皮肤黏膜眼综合征 (史蒂文斯·约翰逊综合征)、 中毒性表皮坏死松解症	高烧、眼充血、眼眵、嘴唇溃烂、喉咙疼痛、皮肤大范围出疹·发红等持续、 急剧恶化。
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、出疹、黄疸(皮肤及眼白发黄)、褐色尿、全身乏力、 食欲不振等症状。
肾障碍	出现发热、出疹、尿量减少、全身浮肿、全身乏力、关节痛(许多关节疼痛)、 腹泻等症状。
无菌性脑膜炎	出现伴随脖颈支撑的剧烈头痛、发热、恶心·呕吐等症状。(此类症状， 特别多见于接受全身性红斑狼疮、混合性结合组织病治疗的患者。)
心肌梗塞*	胸口发紧疼痛、呼吸困难、出冷汗。*
脑血管疾病*	可能会突然出现意识降低或丧失、单侧手足活动困难、头痛、呕吐、头晕、 说话困难或语言不流畅等症状。*
间质性肺炎	爬楼梯、稍微活动便气喘·呼吸困难、出现干咳、发热等，发生突然，或持续。
哮喘	呼吸时，出现气喘吁吁、呼吸困难等症状。
血液疾病	出现喉咙疼痛、发热、全身乏力、脸部及内眼睑发白、容易出血(牙龈出血、鼻血等)、 淤青(按压时颜色也不褪去)等症状。
消化系统疾病	出现大便变黑、吐血、血便、粘液血便(混有血液、粘液、脓液的软便)等症状。
呼吸抑制	出现气喘、呼吸困难等症状。

- 服用后，若出现体温过度下降、虚脱(使不上力)、四肢发凉(手脚冰冷)等症状，应立即停止服用，并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”。
- 服用后，可能会出现下列症状，当下列症状持续或者有增强迹象时，应停止服用，并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”
便秘、口干、嗜睡
- 当服用 5~6 次仍不见症状好转时(特别是发热持续 3 天以上，或者发热反复出现时)应停止服用，并携带此说明书咨询医生、药剂师或者“登録販売者”

效能·效果

感冒的各种症状(喉咙疼痛、发热、恶寒、头痛、咳嗽、有痰、鼻涕、鼻塞、打喷嚏、关节疼痛、肌肉酸痛)的缓解

用法·用量

按照下列剂量尽量在饭后 30 分钟以内以常温水或者温开水服用。

年龄	1次量	1天服用次数
成人(15岁以上)	3片○○○	3次
未满15岁的儿童	✕不可服用	

<用法·用量相关注意事项>

- 请务必严格遵守用法·用量。
- 药片的取出方法：如上图所示用指尖强压装有药片的 PTP 薄膜的突起部，弄破背面的铝箔，然后取出服用。
(错误直接服用可能会引发刺伤食道粘膜等意外事故。)



成分·分量(9片装)

●布洛芬 600mg ●凝血酸 750mg ●盐酸氨溴索 45mg ●d-马来酸氯苯那敏 3.5mg ●磷酸二氢可待因 24mg
●dl-盐酸甲基麻黄碱 60mg ●无水咖啡因 75mg
(添加物)无水硅酸、羟丙甲纤维素、柠檬酸、乳糖、硅酸 Ca、羟丙基纤维素、羧甲基纤维素 Ca、硬脂酸 Mg、三乙酸甘油、滑石粉、氧化钛、黄色五号、巴西棕榈蜡

保管及使用上的注意事项

- 请放在干燥阴凉的地方保管，避免高温及阳光直射。
- 请放在儿童无法触及的地方。
- 请勿放入其他替换容器内。(否则会导致误用及变质。)
- 注意保管及携带，避免 PTP 铝箔损坏、药片破损。
- 请勿服用过期(外盒记载)药品。