

2錠入り

上下の袋に1錠ずつ
包装されています

この分包は、服用の際にはよく
読み、大切に保管してください。

キューピーコーワゴールドα錠

使用上の注意 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用
を中止し、この分包を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹・発赤、かゆみ 消化器：吐き気・嘔吐
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合場合は服用を中止し、この分包を持って医
師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 ●疲労の回復・予防 ●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・
予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい ●病中病後の
体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の
栄養補給

用法・用量 成人(15歳以上)1回1錠、1日1~2回水又は温湯で服用してください。1日
2回服用する場合は、服用間隔を6時間以上おいてください。

〈用法・用量に関連する注意〉 用法・用量を守ってください(他のビタミン等を含有する
製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

成分・分量(2錠中) エゾウコギ乾燥エキス16.0mg(エゾウコギとして400.0mg)、
オキソアミチン末50.0mg、チアミン硝化物(V.B₁)10.0mg、リボフラビン(V.B₂)
4.0mg、ピリドキシン塩酸塩(V.B₆)10.0mg、ニコチン酸アミド25.0mg、L-アスコル
ビン酸ナトリウム112.6mg(L-アスコルビン酸(V.C)として100.0mg)、トコフェール
ルコハク酸エステルカルシウム20.7mg(*dl*-α-トコフェールルコハク酸エステル(V.E)
として20.0mg)、L-アルギニン塩酸塩60.0mg、無水カフェイン50.0mg

〔添加物〕 トウモロコシデンプン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスボ
ピドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、タルク、アラビアゴム、炭酸Ca、白糖、ゼラチ
ン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、リン酸水素Na、酸化チタン、
黄色五号、カルナウバロウ

〈成分・分量に関連する注意〉

ビタミンB₂(リボフラビン)により、尿が黄色になることがあります。

保管及び取り扱い上の注意 (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所
に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に
入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 落下等の衝撃
により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、取扱いに注意し
てください。(5) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製造
番号

使用
期限

お問い合わせ先 興和(株) お客様相談センター
TEL 03-3279-7755 月~金(祝日を除く)9:00~17:00



製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
R9K0