

第3類医薬品

この添付文書は、使用の際にはよく読み、大切に保管してください。


乾燥性皮膚用薬

ケラチナミン^{ユール}20%尿素配合クリーム

ケラチナミン^{ユール}20%尿素配合クリームは、手荒れやゴチゴチかかとの治療薬です。

製品特長

- 「肌をみずみずしくする効果」と「肌をなめらかにする効果」がある尿素20%配合。
- 体内にある水分を皮膚の角質層に効率よく取り込み、皮膚表面から水分が飛ばないようにします。



- ① 尿素が角質をやわらかくして浸透します
- ② 浸透した尿素が体内の水分を集めうるおいを保ちます

このような方に

- 水仕事などで手がガサガサする方に。
- かかとが硬くゴチゴチになる方に。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目のまわり、粘膜等。
- (2)引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位。
- (3)かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4)炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)。



相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

- ③ 2週間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(裏面へ続く)

効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関連する注意>

- ①用法・用量を守ってください。
- ②目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ③小児(15歳未満)には使用させないでください。
- ④外用にのみ使用してください。
- ⑤化粧品ではありませんので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

成分・分量(100g中)

成分	分量	働き
尿素	20.0g	体内の水分を皮膚に取りこんで、皮膚をしっとりなめらかにします。

[添加物]ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリシン

保管及び取扱い上の注意

- ①本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- ②高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ③小児の手の届かない所に保管してください。
- ④他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ⑤使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00

- 興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>

製造販売元

 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14