

鎮痒消炎薬

レスタミン[®]ユー[®]パウダークリーム

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

●成分・分量(1g中)

ジフェンヒドラミン塩酸塩 …………… 20mg [かゆみを抑える]

酸化亜鉛 …………… 100mg [かぶれた皮膚を保護する]

グリチルレチン酸 …………… 1mg [皮膚の炎症を鎮める]

[添加物] 無水ケイ酸、ヒドロキシエチルセルロース、セタノール、ステアリン酸、ミリスチン酸オクチルドデシル、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ステアリン酸ポリオキシル、ポリソルベート20、オレイン酸ソルビタン、パラベン、クエン酸、香料、エタノール

●効能・効果

あせも、かぶれ、湿疹、かゆみ、ただれ、皮膚炎、しもやけ、虫さされ、じんましん

●用法・用量

1日数回適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。



●保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

 製造販売元 興和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

- 本製品には添付文書はついておりません。
外箱の記載事項と同様のものです。