

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

본 제품은 일본 국내법에 근거하여 제조 판매되었습니다. 또한, 이 첨부문서는 일본 국내법에 근거하여 작성한 첨부문서를 번역한 것으로, 일본 국외의 법규에 준거하는 것이 아닙니다.

제2류 의약품

이 첨부문서는, 복용 시 자세히 읽으시고, 소중히 보관하십시오.

비타민 B₁ 주약 제제

キューピーコワコンドロイザーα

Q&P KOWA CHONDROIZER α

사용상의 주의

상담이 필요한 경우

- 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오
(1) 임신부 또는 임신 중으로 추정되는 사람.
(2) 약에 의해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.
- 복용 후, 다음 증상이 나타난 경우는 부작용 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고, 이 첨부문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움증
소화기	구역질·구토, 식욕부진

- 복용 후, 다음 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 지속 또는 심해질 경우는, 복용을 중지하고, 이 첨부문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오
뉘은변, 설사
- 1개월 정도 복용해도 증상이 개선되지 않을 경우에는 복용을 중지하고, 이 첨부문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

효능·효과

- 다음 증상의 완화:
관절통, 근육통(어깨·허리·팔꿈치·무릎 통증, 어깨 결림, 오십견 등), 신경통, 손발 저림, 변비, 눈의 피로(눈의 만성 피로에 따른 침침함, 눈 안쪽의 통증)
- 각기
'단, 1개월 정도 사용해도 1·2의 증상이 개선되지 않을 경우에는, 의사 또는 약사와 상담하십시오.'
- 다음 경우의 비타민 B₁ 보급:
육체 피로 시, 임신·수유기, 병중 및 병후의 체력 저하 시

용법·용량

아래의 양을 물 또는 온수와 함께 복용하십시오.

나이	1회 용량	1일 복용 횟수
성인(15세 이상)	3정 ○○○	2회
15세 미만의 소아	✕복용하지 말 것	

식전, 식후에 관계없이 언제든지 복용할 수 있습니다.

<용법·용량에 관한 주의>

용법·용량을 꼭 지키십시오.

성분·분량 (6정 중)

성분·분량	
방기건조엑스 (방기 3000mg)	240.0mg
콘드로이틴 황산 에스텔나트륨	900.0mg
벤포티아민 [티아민염화물염산염(V.B1) 10.0mg]	13.83mg
메코발라민(V.B12)	60.0 μ g
γ -오리자놀	10.0mg

[첨가물] 하이드록시프로필셀룰로오스, 셀룰로오스, 크로스카르멜로오스나트륨, 스테아린산마그네슘, 폴리비닐알코올·아크릴산·메타크릴산메틸 공중합체, 히프로멜로오스, 산화티탄, 카나우바 왁스

보관 및 취급상의 주의

- 1 고온을 피해 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉한 후 박스에 넣어 보관해 주십시오.(빛이 품질에 영향을 줄 수 있습니다.)
- 2 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있음.)
- 4 수분이 정제에 닿으면, 내용 성분 변화의 원인이 될 수 있으므로, 물방울을 떨어뜨리거나, 젖은 손으로 만지지 마십시오. 실수로 정제를 적신 경우는, 젖은 정제를 폐기하십시오.
- 5 용기 안의 충전물(비닐)은, 수송 중 정제의 파손을 방지하기 위해 넣은 것이므로, 뚜껑을 연 후에는, 반드시 버리십시오.
- 6 용기의 뚜껑을 잘못 닫으면, 습기 등에 의해, 품질에 영향을 줄 수 있으므로, 복용할 때마다 뚜껑을 잘 닫아 주십시오.
- 7 포장용기 및 라벨의 '개봉 연월일' 기입란에, 개봉한 날짜를 기입해 주십시오.
- 8 사용 기한(포장용기 및 라벨에 기재)이 지난 제품은 복용하지 마십시오. 또한, 일단 개봉한 후에는, 품질 유지 측면에서 개봉일로부터 6개월 이내를 기준으로 복용해 주십시오.



판매제조원 코와주식회사 도쿄도 주오구 니혼바시 혼초 3-4-14

Y1411R K1K D1