

かゆみ・虫さされ用薬

ウナークールジェル

ウナークールジェルは、ガツンとした冷却感を患部に与え、蚊などによる虫さされのほてりを鎮め、かゆみをもとから抑え、すばやく効くかゆみ止めです。

製品特長

- l-メントールを4.5%配合し、さらにチューブの先端に金属の「アイスボール[®]」を採用したことにより、ガツンとした冷却感でほてりを鎮めます。
- 有効成分のリドカインがかゆみの伝わりをブロックし、ジフェンヒドラミン塩酸塩がかゆみのもととなるヒスタミンの働きを抑えます。
- 患部にジェルがとどまり、有効成分がしっかりと浸透します。



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の部位には使用しないでください

- (1) 創傷面。
- (2) 目や目の周囲、粘膜等。



相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬や金属などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
- ② 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- ③ 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量(1g中)

成分・分量	働 き
ジフェンヒドラミン塩酸塩 20.0mg	湿疹やかゆみ等のもととなるヒスタミンの働きを抑え、かゆみを鎮めます。
リドカイン 5.0mg	局所麻酔作用により、かゆみの伝わりを止め、かゆみを鎮めます。
l-メントール 45.0mg	患部に清涼感を与え、かゆみをやわらげます。
dl-カンフル 20.0mg	

〔添加物〕 エタノール、ヒプロメロース、エドト酸Na

効能・効果

虫さされ、かゆみ、湿疹、かぶれ、皮膚炎、あせも、しもやけ、じんましん

用法・用量

1日数回適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- ① 用法・用量を守ってください。
- ② 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ③ 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ④ 外用にのみ使用してください。
- ⑤ 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。また、ひざの裏やひじの内側等に使用する場合は、皮膚を密着(正座等)させないでください。

● 容器の使い方

キャップをとり、先端のボールを転がすようにして患部に塗布してください。
(出にくい場合は、少しずつチューブを押しながら塗布してください。)
使用後は必ずキャップをしっかりしめてください。



※患部を清潔にしてから使用してください。

※使用後はチューブ先端を清潔にし、保管してください。

保管及び取扱い上の注意

- ① 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④ 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- ⑤ 本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落としてください。
- ⑥ メガネ、時計、アクセサリなどの金属類、衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- ⑦ 火気に近づけないでください。
- ⑧ 使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お問い合わせ先のお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

● 興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>

 製造販売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14