

第3類医薬品

この薬袋は、使用の際にはよく読み、大切に保管してください。

外用鎮痛消炎薬（貼付剤）

バンテリン[®]ミニツボくん

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この薬袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み、かぶれ

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この薬袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲（うちみ）、捻挫

【成分・分量(膏体100g中)】

サリチル酸グリコール 8.0g

l-メントール 7.0g

トコフェロール酢酸エステル 2.5g

グリチルレチン酸 0.19g

ノニル酸ワニリルアミド 0.03g

〔添加物〕ポリイソブチレン、テルペン樹脂、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、流動パラフィン、BHT

【用法・用量】

プラスチックフィルムをはがし、1日数回、患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (4)本剤を使用後、汗をかくと刺激を感じることがあります。
- (5)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (6)本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴すると刺激を感じることがありますので、入浴の1時間以上前に、はがしてください。また、入浴後は30分程してから使用してください。
- (7)皮膚の弱い人は同じ所に続けて貼らないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)品質保持のため、開封後の未使用分は薬袋に入れ、開口部を折り返して保管してください。
- (5)使用期限(外箱及び薬袋に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お問い合わせのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00



販売元 興和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製造販売元 大協薬品工業株式会社 〒939-3521 富山県富山市水橋島等173

- 本製品には添付文書はついておりません。
薬袋の記載事項と同様のものです。