

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

본 제품은 일본 국내법에 근거하여 제조 판매되었습니다. 또한, 이 첨부문서는 일본 국내법에 근거하여 작성한 첨부문서를 번역한 것으로, 일본 국외의 법규에 준거하는 것이 아닙니다.

제②류 의약품

이 첨부문서는, 사용 시 자세히 읽으시고, 소중히 보관하십시오.

벌레 물림 및
가려움증 치료약

ウナ-ェースプレミアムC
UNA KOWA ACE PREMIUM C

본 약제를 장기간 사용하면 피부 혈관이 확장되어 피부가 붉어지거나 얇아질 수 있습니다. 얼굴은 피부가 붉어지기 쉬우므로 특히 주의가 필요합니다. 본 약제는 화장하기 전 또는 면도 후에 사용하지 마십시오. 또한, 증상이 호전된 후에는 습관적인 사용을 삼가십시오.

사용상의 주의

금기 사항

(지키지 않을 경우 현재의 증상이 악화되거나, 부작용이 발생하기 쉬워집니다)

- 다음 부위에는 사용하지 마십시오
수두, 무좀·백선 등 또는 화농성 환부.
- 얼굴에 광범위하게 사용하지 마십시오
- 장기간 연속하여 사용하지 마십시오

상담이 필요한 경우

- 다음 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오
(1)의사의 치료를 받는 사람.
(2)임산부 또는 임신 중으로 추정되는 사람.
(3)약에 의해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.
(4)환부 범위가 넓은 사람.
(5)습윤 및 짓무름이 심한 사람.
- 사용 후, 다음 증상이 나타난 경우는 부작용 가능성이 있으므로, 즉시 사용을 중지하고, 이 첨부문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움증, 부기
피부(환부)	무좀·백선 등의 백선, 여드름, 화농 증상, 지속적인 자극감

- 5~6일 정도 사용해도 증상이 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지하고, 이 첨부문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

효능·효과

벌레물린곳, 가려움증, 습진, 접촉성피부염, 피부염, 땀띠, 두드러기

성분·분량(1g중)

●프레드니솔론발레로아세테이트 3.0mg ●디펜히드라민염산염 20.0mg ●살리실산글리콜 10.0mg ●L-멘톨 35.0mg
●DL-카파 10.0mg

[첨가물] 중쇄트리글리세라이드, 디이소프로필아디페이트, 디메틸폴리실록산, 글리세린, 베헤닐알코올, 폴리옥시에틸렌아라킬에테르, 스테아릴알코올, 소르비탄 스테아레이트, 잔탄검, 히프로멜로스, 파라벤, 구연산, 구연산 나트륨

용법·용량

하루에 수차례 적당량을 환부에 발라 주십시오.

<용법·용량에 관한 주의>

- (1)용법·용량을 꼭 지키십시오.
 - (2)소아가 사용하는 경우에는, 보호자의 지도감독 아래 사용하십시오.
 - (3)눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만일, 눈에 들어갔을 경우에는, 즉시 물 또는 미온수로 씻어 주십시오.
또한, 증상이 심한 경우에는, 안과 의사의 진료를 받아 주십시오.
 - (4)외용으로만 사용하십시오.
 - (5)이 약을 바른 환부를 투명필름 등의 공기가 잘 통하지 않는 것으로 덮지 마십시오. 또한 기저귀가 닿는 부분에 사용하는 경우는 딱 맞는 기저귀나 비닐제 등 밀봉성이 있는 속옷은 사용하지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 뚜껑을 단단히 닫아 주십시오.

보관 및 취급상의 주의

- (1)고온을 피하여, 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오.
- (2)어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3)다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있음.)
- (4)사용 기한(포장용기 및 튜브에 기재)이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

- 벌 등에 쏘였을 때 광범위한 부종 및 부기, 호흡곤란, 메스꺼움, 설사, 발열 등의 증상이 나타나면 즉시 의사의 진료를 받아 주십시오.
- 증상이 심하거나 환부가 광범위할 경우, 본 약제로는 대처할 수 없는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 의사의 진료를 받아 주십시오.