

第②類医薬品

かゆみ・虫さされ用薬

ウナ-α

蚊やダニ、ブユなどにさされたりすると、皮膚は敏感に反応してかゆくなります。そして、そのまま放っておくと、かゆみがどんどん増したり赤くはれてきたりします。ウナ-αをお塗りになりますと、まずリドカインがかゆみの伝わりを止めるのと同時に、ジフェンヒドラミン塩酸塩がかゆみのもととなるヒスタミンの働きを抑えます。さらに、デキサメタゾン酢酸エステルが、かゆみが悪化したり患部が赤くはれてしまう原因となる「炎症」を抑えることで、かゆみにしっかり効いていきます。虫にさされたりしてかゆい時には、ウナ-αで早めに手当てをしてください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2) 創傷面。
- (3) 目や目の周囲、粘膜等。

2. 顔面には、広範囲に使用しないでください

3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量 (1mL中)

成分・分量	働 き
デキサメタゾン酢酸エステル 0.25mg	かゆみが悪化したり皮膚が赤くはれる原因となる炎症を抑えるステロイド成分です。
ジフェンヒドラミン塩酸塩 20.0mg	湿疹やかゆみ等のもととなるヒスタミンの働きを抑え、かゆみを鎮めます。
リドカイン 5.0mg	局所麻酔作用により、かゆみの伝わりを止め、かゆみを感じなくします。
l-メントール 30.0mg	患部に清涼感を与え、かゆみをやわらげます。
dl-カンフル 20.0mg	

[添加物] エデト酸Na、クエン酸、ゲラニオール、エタノール

効能・効果

かゆみ、虫さされ




用法・用量

1日数回適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。また、ひざの裏やひじの内側等に使用する場合は、皮膚を密着(正座等)させないでください。

●容器の正しい使い方

		
1. まずキャップをはずして、図のように容器を逆さに持ってください。	2. ムラなく塗れるようスポンジ面を軽く患部に押しつけ、液を充分に浸透させて塗布してください。	3. 使用後は必ずキャップをしっかりとめてください。

※使用感がよく、破れにくいスポンジ素材を使用していますが、液がスポンジ面に充分浸透していないと、スポンジ面が破れるおそれがありますので、注意してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (5) 容器が変形するおそれがありますので、車の中など、高温になる場所に放置しないでください。容器の変形により、スポンジ部分の脱落や、液もれがおこるおそれがありますので注意してください。
- (6) 本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落としてください。
- (7) メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (8) 火気に近づけないでください。
- (9) 使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。



本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00



 製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14