ビタミン含有保健薬

滋養強壮・ 肉体疲労時の栄養補給

キューピーコーワゴールド 🏻

絶え間なく変化を続ける現代生活、気付かないうちについつい無理をしてしまいがちです。

このようにして蓄積された疲れは、一晩休んだり、短い休暇をとったくらいではなかなか取れず、 からだ全体に疲れがたまりやすい状態になります。

こうしたからだに対しては、疲れに効く成分を補給するだけでなく、からだに元気をつける成分をも 補給することが大切になります。

キューピーコーワゴールドαは植物由来の滋養強壮生薬であるエゾウコギ乾燥エキス、オウギ乾 燥エキス、ニンニク抽出成分(オキソアミヂン末)に加え、L-アルギニン塩酸塩と6種のビタミンが 同時配合されています。

1回わずか1錠。しかも1日1回の服用でも、よく効くように出来ています。

からだ全体が疲れていると感じた時や、からだに元気をつけたい時には、早めにこのキューピー コーワゴールドαの服用をおすすめします。

⚠ 使用上の注意

離 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この 添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合 には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
- 4.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は 登録販売者に相談してください

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳 期などの場合の栄養補給

用法・用量

下記の量を水又は温湯で服用してください。

年	岭	1回量		1日服用回数
成人(15歳	以上)	1錠		1~2回
15歳未満の)小児	服用しないこと		

●朝・昼・晩、食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。

(1日2回服用する場合は、1回目の服用から6時間以上間隔をあけられることをおすすめします。)

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。





成分・分量(2錠中) 成分 · 分量 エゾウコギの根から抽出された成分で、疲れ エゾウコギ乾燥エキス 12.0mg に効くと同時に、すぐれた滋養強壮効果を (エゾウコギとして 300mg) あらわします。 キバナオウギの根から抽出された成分で、生 オウギ乾燥エキス 30.0mg 体内の新陳代謝を高め、すぐれた滋養強壮 (オウギとして 240mg) 効果をあらわします。 ニンニクから抽出された成分で、ニンニク特有 オキソアミヂン末 のニオイがおさえてあり、からだの調子が悪い 50.0mg 時、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。 アミノ酸の一種で、からだに元気がない時、 L-アルギニン塩酸塩 50.0mg エネルギー源の合成・貯蔵を促進します。 チアミン硝化物(V.B₁) 10.0mg リボフラビン(V.B₂) 4.0mg ピリドキシン塩酸塩(V.B6) 10.0mg 疲れたからだに必要な6種のビタミンが補給 トコフェロールコハク酸エステルカルシウム 20.7mg され、栄養物のエネルギー化を促します。 $[dl-\alpha-h]$ フェロールコハク酸エステル(V.E)として 20.0mg]

〔添加物〕ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、クロスポビドン、セルロース、ステアリン酸Mg、 ヒプロメロース、タルク、白糖、炭酸Ca、ゼラチン、アラビアゴム、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン グリコール、酸化チタン、リン酸水素Na、黄色五号、カルナウバロウ

112.6mg

25.0mg

50.0mg 中枢神経に働いて、疲れに効きます。

<成分・分量に関連する注意>

L-アスコルビン酸ナトリウム

ニコチン酸アミド

無水カフェイン

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB2(リボフラビン)によるものですから心配 ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

[アスコルビン酸(V.C)として 100.0mg]

- (4) 水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、 亀裂を生じたりすることがありますので、 水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた 錠剤を廃棄してください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるもので、 キャップをあけた後は、必ず捨ててください。
- (6) ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合が ありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。
- (7) 容器の落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、 外箱に入れて保管するなど、取扱いに注意してください。
- (8) 外箱及びラベルの 「開封年月日」 記入欄に、キャップをあけた日付を記入してください。
- (9) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。 また、一度キャップをあけた 後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は 興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14 TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566 電話受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00





(Kowa) 製造販売元 興 和 採 式 會 社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14