

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

本产品根据日本法律进行制造和销售。另外，说明书是由基于日本法律制作的说明书翻译而来，并非遵照日本以外国家的法规。

需要指导的药品

请妥善保管此说明书，并在服用时，仔细阅读。

综合感冒药 **コルゲン^{ユー}ー^ワLX錠**

COLGEN KOWA LX TABLET

使用上的注意事项

禁止事项

(如不遵守容易导致现有症状加重、出现副作用・事故等)

- 以下人士禁止服用
 - 对本药品或者本药品成分过敏者。
 - 有服用本药品或者其他感冒药、解热镇痛药引起哮喘的患者。
 - 未满 15 岁的儿童。
 - 正在医疗机构接受以下治疗者。胃溃疡・十二指肠溃疡、肝病、肾病、心脏病
 - 被医师诊断为红血球数少(贫血)、血小板数少(止血难、容易出血)、白血球数少等血液异常(血液相关疾病)的人群。
 - 距预产期 12 周以内的孕妇。
- 在服用本药品期间，请不要使用以下任何一种医药品
其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺药成分的内服药等(鼻炎用内服药、晕车药、过敏药等)
- 服用本药品后，请勿开车或者操作机械类工具(可能会出现嗜睡等。)
- 哺乳期妇女请勿服用本药品，如需服用本药品请暂停哺乳
- 服用前后请勿饮酒
- 用药请勿超过 5 天

咨询相关事项

- 以下人士服用前请先咨询医生或者药剂师
 - 正接受医生或者牙科医生治疗者。
 - 孕妇或者可能妊娠的妇女。
 - 高龄者。
 - 对药品等过敏者。
 - 有以下症状者。高烧、排尿困难
 - 经诊断有以下疾病者。 支气管哮喘、溃疡性结肠炎、节段性回肠炎、全身性红斑狼疮、混合性结合组织病、甲状腺功能障碍、糖尿病、心脏病、高血压、青光眼、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症
 - 患有下列疾病的患者。 胃溃疡・十二指肠溃疡、肝病、肾病、血液疾病
- 服用后，若出现下列症状则可能是出现了副作用，应立即停止服用，并携带此说明书咨询医生或者药剂师
 - 出现体温过度下降、虚脱(乏力)、四肢冰冷(手脚冷)等症状时。(2) 出现消化性溃疡、浮肿时。另外，罕有消化管出血(出现吐血、恶心・呕吐、腹痛、黑色焦油状便、血便等)、消化管穿孔(消化管有洞。出现恶心・呕吐、强烈腹痛等)、小肠・大肠狭窄・阻塞(恶心・呕吐、腹痛、腹胀等)重度症状。此时请立即接受医生的诊疗。(3) 出现下列症状时。

相关部位	症状
皮肤	出疹・发红、瘙痒
消化系统	恶心・呕吐、食欲不振、烧心、腹痛、口腔炎、胃部不舒服、腹胀、消化不良
精神神经系统	头晕、头痛、麻木、嗜睡
循环系统	心悸、血压上升
泌尿系统	血尿
其他	发热、面部潮热、贫血、倦怠感、胸痛

罕有以下严重症状发生。以下情况请立即接受医生的诊疗。

症状名称	症状
休克(过敏反应)	服用后，立刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。

(连接背面)

皮肤黏膜眼综合征 (史蒂文斯·约翰逊综合征)、 中毒性表皮坏死松解症、多形性红斑、 急性泛发性发疹性脓疱病	高烧、眼充血、眼眵、嘴唇溃烂、喉咙疼痛、皮肤大范围出疹·发红、 在皮肤发红部位出现水泡、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等持续、 急剧恶化。
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、出疹、黄疸(皮肤及眼白发黄)、褐色尿、全身乏力、 食欲不振等症状。
肾障碍	出现发热、出疹、尿量减少、全身浮肿、全身乏力、关节痛(许多关节疼痛)、 腹泻等症状。
无菌性髓膜炎	出现伴随脖颈支撑的剧烈头痛、发热、恶心·呕吐等症状。(此类症状， 特别多见于接受全身性红斑狼疮、混合性结合组织病治疗的患者。)
间质性肺炎	爬楼梯、稍微活动便气喘·呼吸困难、出现干咳、发热等，发生突然，或持续。
横纹肌溶解症	出现手脚·肩·腰等的肌肉痛、手脚麻木、使不出力、僵硬、全身乏力、 赤褐色尿等症状。
哮喘	呼吸时，出现气喘吁吁、呼吸困难等症状。
再生障碍性贫血	出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或粘膜发白、疲劳感、心悸、气短、 身体不适、难以站稳、血尿等症状。
粒细胞缺乏症	出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。
血液障碍	出现喉咙疼痛、发热、全身乏力、面部和眼睑背后发白,变得容易出血(刷牙出血、 鼻血等)、淤青(按压也消退)等。
充血性心力衰竭	出现全身乏力、心悸、气喘、胸部不适、胸痛、头晕、晕厥等症状。
呼吸抑制	出现气喘、呼吸困难等症状。

- 服用后，可能会出现下列症状，当下列症状持续或者有增强迹象时，应停止服用，并携带此说明书咨询医生或者药剂师
口干、便秘、腹泻、嗜睡
- 当服用 5~6 次仍不见症状好转时(特别是发热持续 3 天以上，或者发热反复出现时)应停止服用，并携带此说明书咨询医生或者药剂师

效能·效果

感冒的各种症状(发热、喉咙疼痛、咳嗽、有痰、恶寒、头痛、鼻涕、鼻塞、打喷嚏、关节疼痛、肌肉酸痛)的缓解

用法·用量

按照下列剂量尽量在饭后 30 分钟以内以常温水或者温开水服用。

年龄	1次量	1天服用次数
成人(15 岁以上)	3片○○○	3次
未满 15 岁的儿童	✕不可服用	

<用法·用量相关注意事项>

- 请务必严格遵守用法·用量。
- 药片的取出方法：如上图所示用指尖强压装有药片的 PTP 薄膜的突起部，弄破背面的铝箔，然后取出服用。
(错误直接服用可能会引发刺伤食道粘膜等意外事故。)



成分·分量(9片装)

●环氧洛芬钠 204.3mg (无水物 180mg) ●磷酸二氢可待因 24mg ●d-马来酸氯苯那敏 3.5mg ●dl-盐酸甲基麻黄碱 60mg ●愈创甘油醚 250mg ●无水咖啡因 40mg
(添加物)纤维素、羟丙基纤维素、羧甲基纤维素 Ca、磷酸氢钙、铝碳酸镁、硬脂酸 Mg、羟丙甲纤维素、聚乙二醇、滑石粉、氧化钛、三氧化二铁、巴西棕榈蜡

保管及使用上的注意事项

- 请放在干燥阴凉的地方保管，避免高温及阳光直射。
- 请放在儿童无法触及的地方。
- 请勿放入其他替换容器内。(否则会导致误用及变质。)
- 注意保管及携带，避免 PTP 铝箔损坏、药片破损。
- 请勿服用过期(外盒记载)药品。