

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。また、この添付文書は日本国法に基づき作成した添付文書を翻訳したものであり、日本国外の法規に準じているわけではありません。

本産品係依據日本國內法令製造販賣。此外，此說明書為依據日本國內法令規定之說明書的日翻中譯本，並不必然代表遵照日本國外之法令。

第3類醫藥品

服用前，請詳閱此說明書，並請妥善進行保管。

## 維他命成分保健藥品 **キューピーコーワゴールドαプレミアム** Q&P KOWA GOLD α PREMIUM

### 使用上の注意事項

#### 諮詢

- 以下人士請於服用前諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」  
對藥物等曾發生過敏反應者。
- 服用後，如出現下列症狀時有可能是副作用所導致，請立即停止服用，並持本說明書諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」

相關部位	症狀
皮膚	發疹・發紅、搔癢
消化器官	噁心・嘔吐
- 服用後，可能出現下列症狀，當此症狀持續或者惡化時，請停止服用，並持本說明書諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」  
腹瀉
- 若連續服用一陣子後症狀仍未見改善時請停止服用，並持本說明書諮詢醫師、藥師或者「登録販売者」

#### 效能・效果

滋養強身、虛弱體質、身體疲勞、病後體力衰弱、食欲不振、營養不良、熱性消耗性疾病、懷孕哺乳期間等的營養補給

#### 用法・用量

請依以下指示，以開水或者溫開水服用。

年齡	一次量	一天服用次數
成人(15歲以上)	1錠 <sup>○</sup>	1~2次
未滿15歲的孩童	✕請勿服用	

- 早、中、晚、飯前、飯後隨時皆可服用。  
(1天服用2次時，第1次服用後，建議間隔6小時以上再服用第2次。)

<關於用法・用量的注意事項>

請嚴守用法・用量。

#### 成分・含量(2錠中)

成分・含量	
杜仲乾燥萃取物 (換算杜仲 200mg)	14.0mg
芍藥乾燥萃取物 (換算芍藥 120mg)	17.1mg
刺五加乾燥萃取物 (換算刺五加 350mg)	14.0mg
黃耆乾燥萃取物 (換算黃耆 240mg)	30.0mg
大蒜萃取粉	50.0mg
L-精氨酸鹽酸鹽	50.0mg
硝酸硫胺明(V.B1)	10.0mg
核黃素(V.B2)	4.0mg
鹽酸吡哆醇(V.B6)	10.0mg
生育醇琥珀酸鈣 〔換算琥珀酸 dl-α-生育醇酯(V.E) 20mg〕	20.7mg
L-抗壞血酸鈉 〔換算L-抗壞血酸(V.C) 100mg〕	112.6mg
無水咖啡因	50.0mg

(背面續)

[添加物] 纖維素、羥丙基纖維素 (HPC)、聚乙烯聚吡咯烷酮、硬脂酸 Mg、羥丙甲纖維素、滑石、阿拉伯膠、碳酸 Ca、白糖、明膠、聚氧乙烯聚氧丙二醇、磷酸氫二 Na、二氧化鈦、黃色 5 號、棕櫚蠟

Ingredients/contents	
Eucommia bark extract powder (200mg as Eucommia bark)	14.0mg
Peony root extract powder (120mg as Peony root)	17.1mg
Siberian ginseng extract powder (350mg as Siberian ginseng)	14.0mg
Astragalus root extract powder (240mg as Astragalus root)	30.0mg
Oxoamidine powder	50.0mg
L-arginine hydrochloride	50.0mg
Thiamine nitrate (V.B1)	10.0mg
Riboflavin (V.B2)	4.0mg
Pyridoxine hydrochloride (V.B6)	10.0mg
Tocopherol calcium succinate [20mg as <i>dl</i> - $\alpha$ -tocopherol succinate (V.E)]	20.7mg
Sodium L-ascorbate [100mg as L-ascorbic acid (V.C)]	112.6mg
Anhydrous caffeine	50.0mg


[Inactive ingredients] Cellulose, hydroxypropyl cellulose, crospovidone, magnesium stearate, hypromellose, talc, gum arabic, calcium carbonate, sucrose, gelatin, polyoxyethylene polyoxypropylene glycol, dibasic sodium phosphate, titanium oxide, yellow No. 5, carnauba wax

#### < 關於成分・含量的注意事項 >

維他命 B<sub>2</sub>(核黃素) 有時會導致尿液偏黃。

#### 保存及使用上的注意事項

- 請拴緊瓶蓋並避免高溫及陽光直射，宜保存於乾燥陰涼處。
- 請保存於孩童不易拿取之處。
- 請勿將本藥劑移放到其他容器。(以避免誤用或者引起品質變化。)
- 請勿滴落水滴或以濕手碰觸，以免藥劑沾到水分後，可能導致藥劑表面變色或龜裂。若不慎弄濕藥劑，請將沾有水分的藥劑丟棄。
- 容器內的填充物(塑膠)是，為了防止錠劑在搬運過程中發生破損，開瓶後，請務必取出丟棄。
- 容器的瓶蓋若沒有蓋緊，會因受潮等引起變質，所以每次服用後請務必拴緊瓶蓋。
- 容器掉落等的衝擊，可能會導致藥劑龜裂，進而影響品質，因此請裝進外盒中保存等，並小心使用。
- 請在外包裝盒及標籤的「開封日期」填寫欄中，填寫開啟瓶蓋的日期。
- 產品超過使用期限(記載於外包裝盒及標籤)時請勿服用。另外，為確保品質，請在開啟瓶蓋後自開瓶日算起的六個月以內服用。



製造販賣商 興和株式會社 東京都中央區日本橋本町三丁目4-14

Y1180R EOK C1